

IOH. CHRIST. FABRICH

HIST. NAT. OECONOM. ET CAMERAL. P. P. O.
SOCIET. HAFN. NORW. SCAND. BEROL. NAT. CURIOS. LIPS.
LUND. PETROP. OECON. TAURIN. LOND. HIST. NAT.
JENENS. BOURD. NEC NON PARIS. AGRICULT. HIST.
NAT. ET PHILOM. MEMBR.

SYSTEMA ANTLIATORUM

SECUNDUM

ORDINES, GENERA, SPECIES

ADIECTIS

SYNONYMIS, LOCIS, OBSERVATIONIBUS,
DESCRIPTIONIBUS.

BRUNSVIGAE

APUD CAROLUM REICHARD.

1805.

75. PEDICULUS. *Haustellum retractile, rectum, curvum.*

Antennae porrectae, quinquearticulatae.

- humanus.* 1. *P. abdomine lobato cinereo.* Ent. syst. 4. 417.
1. Linn. syst. Nat. 2. 1016. 1. Fn. Sv. 1939.
Red. Exper. tab. 18.
— Oper. tab. 25.
Swammerd. Bibl. Nat. tab. 1. fig. 3. - 6.
Albin. Aran. tab. 42.
Bonann. Microsc. fig. 55.
Back. Microsc. tab. 13. fig. 4.
Sulz. Inf. tab. 22. fig. 145.
Lidemall. Microsc. 45. tab. 21.
Habitat in capite et vestimentis humanis. In
pueris gulosis frequentissimus.
Varietas capitis durior, coloratior, vestimento-
rum laxior magis cinerea.

- Nigrita-
rum.* 2. *P. capite triangulo ater, corpore rugoso.*
Habitat in Nigritarum corpore Dom. Smidt.
Muf. Dom. Lund.
Paullo minor *P. huinano.* Caput magnum, pla-
num, laeve, triangulum, antice subbifidum,
atrum. Corpus subrugosum, atrum, imma-
culatum.

3. *P.*

Pediculi corpus parvum, ovatum, apterum, depresso-
planum, immarginatum, tardum, capite parvo, rotun-
dato, exerto, oculis lateralibus, ovatis, distantibus,
antennis longitudine capitis, thorace ovato brevi, sutrillo,
nullo, abdomine ovato, depresso, ano obtuso, alis nullis,
pedibus sex brevibus, validis.

3. *P. abdomine postice emarginato, pedibus cheli- Pubis.*
formibus. Ent. syst. 4. 418. 2. Linn. syst.
Nat. 2. 1017. Fn. Sv. 1940.

Red. Exper. tab. 19. fig. 1.

Hospitatur in hominis immundi pubes, super-
ciliis. Pellitur oleo Tabaci, sapone nigro,
Mercurio.

4. *P. abdomine orbiculato: linea alba, scutello tri. ricinoides.*
lobo, rostro albo. Ent. syst. 4. 418. 3. Linn.
syst. Nat. 2. 1017. 3.

Habitat in America pedes obambulantium intrans,
sanguinem hauriens, in iis ova deponens, ul-
cera cacoethica caussans.

5. *P. capite porrecto acuminato ferrugineus, abdo- Cameli.*
mine ovato. Ent. syst. 4. 418. 4. Linn. syst.
Nat. 2. 1017. 6.

Red. Exper. tab. 22.

— Oper. tab. 25.

Albin. Aran. 76. tab. 51.

Habitat in Africæ Camelis.

6. *P. Cervi.* Ent. syst. 4. 418. 5. Linn. syst. Nat. *Cervi.*
2. 1017. 5.

Frisch. Inf. 12. tab. 5.

Red. Exper. tab. 5.

Panz. Fn. Germ. 51. tab. 15.

Habitat in Cervo Elapho, Dama.

7. *P. Ovis Arietis.* Ent. syst. 4. 419. 6. Linn. *Ovis.*
syst. Nat. 2. 1017. 8. Fn. Sv. 1945.

Red. Exper. tab. 22. fig. 1.

Habitat in Ove Ariete.

8. *P. ovatus planus marginatus thorace rufescente, Melis.*
abdomine albido.

Habitat in Urso Mele Muf. Dom. Lund.

Corpus

Corpus parvum, planum, ovatum: margine magno, prominulo, integro. Thorax magis obtusus. Abdomen pallidum.

Bufali.

9. P. obscure cinereus: striis fuscis obscuris, abdomine tuberculis decem conicis marginalibus. Ent. syst. 4. 419. 7.
Degeer Inf. 7. 68. 3. tab. 1. fig. 11. 12.

Habitat in *Bufalis Cap. bon. spei.*
Pediculo humano paulo major, obscurus margine abdominalis tuberculis decem conicis, validis.

Bovis.

10. P. abdomine lineis transversis octo ferrugineis. Ent. syst. 4. 419. 8. Linn. syst. Nat. 2. 1017. 9. Fn. Sv. 1946.

Habitat in *Europae Bobus. Pellitur Decocto Ledi et Sedi acris.*

Vituli.

11. P. abdomine acuminato plumbeo: Ent. syst. 4. 419. 9. Linn. syst. Nat. 2. 1018. 10. Fn. Sv. 1947.

Habitat in *Europae Bobus.*

Equi.

12. P. Equi Caballi. Ent. syst. 4. 419. 10. Linn. syst. Nat. 2. 1018. 11. Fn. Sv. 1948.
Habitat in *Europae Equis.*

Afini.

13. P. capite porrecto obtuso, abdomine ovato fuscō striato. Ent. syst. 4. 419. 11. Linn. syst. Nat. 2. 1018. 12.
Albin. Aran. 76. tab. 51.
Red. Exper. tab. 22. fig. 1.
— Oper. tab. 25.
Habitat in *Afinis.*

Suis.

14. P. capite cylindrico niger tibiis apice unidentatis.
Pediculus Suis. Linn. syst. Nat. 2. 1915. 4.
Fn. Sv. 1942.

Pedi-

Pediculus Afni. Red. Exper. tab. 21.

Panz. Fn. Germ. 51. tab. 16.

Habitat in *Suibus.*

Magnus. Caput exsertum, cylindricum, antennis quinquearticulatis: articulis subaequalibus, ultimo subulato. Abdomen margine lobato. Pedes incurvi tibiis apice dente valido. Unques acuti validi; arcuati.

15. P. oblongus abdome fusco: lineis duabus *Vulturis.* flavescentibus. Ent. syst. 4. 419. 12.*

Habitat in *Indiae orientalis Vulturibus Dr. Koenig.*

Maximus in hoc genere. Abdomen fuscum, lineis deabus basi apiceque coeuntibus flavis. Interdum praeterea linea media abbreviata etiam flava. Antennae exsertae, nigrae, fere moniliformes. Pedes flavescentes: margine nigro.

16. T. capite sagittato poslice utrinque mucronato. *Tinnunculi.* Ent. syst. 4. 420. 13. Linn. syst. Nat. 2. 1018. 73. Fn. Sv. 1949.

Albin. Aran. tab. 43.

Red. Exper. tab. 13.

Panz. Fn. Germ. 51. tab. 17.

Frisch. Inf. 11. 24. tab. 24.

Habitat in *Falcone Tinnunculo.*

17. P. abdomine marginato: segmentis utrinque *Buteonis.* punctis duobus impressis. Ent. syst. 4. 420. 14.*

Pediculus maximus. Scopol. carn. 1036.

Habitat in *Falcone Buteone.*

18. P. abdomine ovato albo: margine pedibusque *Strigis.* rubris. Ent. syst. 4. 420. 15.*

Pediculus haematopus. Scopol. carn. 1035.

Habitat in *Strigibus, Falconibus.*

19. P.

- Lanii.* 19. P. abdomine ovato griseo: margine utrinque striis octo nigris. Ent. syst. suppl. 570. 15.*
Habitat in *Lanio Collurione* Dom. Cuvier.
- Corvi.* 20. P. abdomine ovato: margine striato. Ent. syst. 4. 420. 16. Linn. syst. Nat. 2. 1018. 14.
Fn. Sv. 1940.
Geoff. Inf. 2. 600. 8.
Degeer Inf. 7. 26. 3. tab. 4. fig. 11.
Red. Exper. tab. 16. fig. 2.
— Oper. tab. 24.
Habitat in *Europae Corvis*.
- Cornicis.* 21. P. abdomine ovato pallido: maculis lateralibus nigris: pupilla alba. Ent. syst. 4. 420. 17.
Pediculus ocellatus. Scopol. carn. 1038.
Habitat in *Corvo Cornice*.
- Infausti.* 22. P. thorace angustato, abdomine ovato pallido diaphano. Ent. syst. 4. 420. 18. Linn. syst. Nat. 2. 1018. 15. Fn. Sv. 1951.
Habitat in *Corvo infausto*.
- Picae.* 23. P. capite obtuso fusco: punctis quatuor nigris. Ent. syst. 4. 420. 19. Linn. syst. Nat. 2. 1018. 16.
Albin. Atan. 76. tab. 45.
Red. Exper. tab. 5.
Habitat in *Corvo Pica*.
- Orioli.* 24. P. albus abdomine linea dorsali fusca. Ent. syst. 4. 421. 20.
Pediculus dolichocephalus. Scop. carn. 1039.
Habitat in *Coracia, Oriolo*.
- Pici.* 25. P. ovatus albidus, abdominis medio nigro, thorace antice angustato. Ent. syst. Suppl. 571. 23.*
Habitat in *Pico viridi* Dom. Cuvier.

26. P.

26. P. abdomine oblongo albido fusco fasciato. *Cuculi*. Ent. syst. 4. 421. 21.*
Pediculus fasciatus. Scopol. carn. 1040.
Habitat in *Cuculo canoro*.
27. P. capite emarginato, abdomine ovato: in margini nigro striato. Ent. syst. 4. 421. 22. Linn. syst. Nat. 2. 1018. 17.
Albin. Aran. 76. tab. 58.
Red. Oper. tab. 20.
Habitat in *Cygno*.
28. P. filiformis pallidus, margine nigro punctato. *Anseris*. Ent. syst. 421. 23. Linn. syst. Nat. 2. 1018. 18. Fn. Sv. 1952.
Albin. Aran. 76. tab. 58.
Red. Exper. tab. 10.
Habitat in *Anseribus feris mansuetisque*. *Pellitur Pipere*.
29. P. ovatus depresso obscurus, abdomine nigro: *anserinus*. segmentorum marginibus flavis.
Habitat in *Anate Antere* Mus. Dom. de Sehestedt.
Magnus in hoc genere. Caput magnum, prominens, triangulum, nigrum: macula dorsali flavicante. Thorax planus lobo antico obconico, canaliculato, fusco, postico latiore. Abdomen planum, obscurum, segmentorum marginibus flavis. Pedes flavescentes.
30. P. elongatus albidus: margine nigro, capite *Anatis*. lutescente. Ent. syst. Suppl. 571. 23.*
Habitat in *Anate Boschate* Dom. Cuvier.
31. P. albidus capite flavescente, corpore elongato. *Mergi*. Ent. syst. 4. 421. 24.
Ricinus Mergi ferrati. Degeer Inf. 7. 78. 5.
tab. 4. fig. 13.
Habitat in *Mergis ferratis*.
32. P.

Proctilariace.

32. *P. elongatus filiformis pilosus fuscus, pedibus pallidis.* Ent. syst. 4. 421. 25.
Habitat in Procellariis Brasiliae Mus. D. Banks.
Corpus maximum. Caput obtusum et fere emarginatum..

Vagelli.

33. *P. ovatus pallidus thorace lineis duabus fuscis.*
Ent. syst. 4. 421. 26. *
Habitat in Procellaria glaciali Dom. Mohr.

Tantali.

34. *P. elongatus filiformis flavescens: linea laterali atra.* Ent. syst. suppl. 571. 26. *
Habitat in Tantalo leucocephalo Indiae Dom. Daldorff.

Diomedae.

35. *P. capite obtuso albus abdominis lateribus nigris.* Ent. syst. 4. 421. 27. *
Habitat in Brasiliae Diomedis Mus. Dom. Banks.

Sternae.

36. *P. capite trigono, abdome ovato pallido: dorso longitudinaliter nigricante.* Ent. syst. 4. 422. 28. Linn. syst. Nat. 2. 1019. Fn. Sv. 1953.
Degeer Inf. 7. 77. 4. tab. 4. fig. 12.
Red. Exper. tab. 9. fig. 2.
Habitat in Sternis, Laris.

Plataleae.

37. *P. Plataleae Leucorodiae.* Ent. syst. 4. 422. 29. Linn. syst. Nat. 2. 1019. 22,
Habitat in Plataleis.

Ardeae.

38. *P. Ardeae cinereae.* Ent. syst. 4. 422. 30.
Linn. syst. Nat. 2. 1019. 23.
Panz. Fn. Germ. 59. tab. 18.
Red. Exper. tab. 6.
Habitat in Ardeis.

Gruis.

39. *P. abdome subclavato pallido: spiraculis niveis.* Ent. syst. 4. 422. 31. Linn. syst. Nat. 2. 1019. 24. Fn. Sv. 1954.
Red.

Red. Exper. tab. 3.

— Oper. tab. 19.

Frisch. Inf. 5. 15. tab. 4.

Habitat in Gruibus.

40. *P. elongatus filiformis abdomine albo: lateri. Ciconias. bus nigro punctatis.* Ent. syst. 4. 422. 32.
Linn. syst. Nat. 2. 1019. 25. Fn. Sv. 1955.
Frisch. Inf. 8. 9. tab. 6.
Habitat in Europae Ciconiis.

41. *P. Charadrii pluvialis.* Ent. syst. 4. 422. 33. *Charadrii.*
Linn. syst. Nat. 2. 1019. 26.
Red. Exper. tab. 4.
Habitat in Europae Charadriis.

42. *P. Fulicae atrae.* Ent. syst. 4. 422. 34. Linn. *Fulicæ.*
syst. Nat. 2. 1019. 27.
Red. Exper. tab. 4.
Habitat in Fulica atra.

43. *P. oblongus fuscus capite trigono canaliculato. Recurvirostris.* Ent. syst. 4. 422. 35. Linn. syst. Nat. 2. rostrat. 1019. Fn. Sv. 1956.
Habitat in Recurvirostris.

44. *P. glaucus thorace angustissimo, abdome Haemato-ovato: incisuris pallidis.* Ent. syst. 4. 423. podis. 36. Linn. syst. Nat. 2. 1019. 29. Fn. Sv. 1957.
Habitat in Haematopode ostralego.

45. *P. capite maximo globoso, corpore pallido fu- Pavonis. scoque striato,* Ent. syst. 4. 423. 37. Linn. syst. Nat. 1019. 30.
Geoff. Inf. 2. 600. 9.
Panz. Fn. Germ. 51. tab. 19.
Latreille Fourm. 389. tab. 12. fig. 5.
Albin. Aran. 76. tab. 47.

Frisch.

- Frisch. Inf. tab. 3. fig. 6.
 Red. Exper. tab. 15.
 — Oper. tab. 23.
 Habitat in Pavonibus.
 Os absque haustello mandibula crassa, cornea,
 apice bifida. Latr. an rite?
- Meleagri-* 46. P. capite trigono obtuso, abdomine ovato gri-
 dis. Ent. syst. 4. 423. 38. Linn. syst. Nat.
 2. 1020. 31. Fn. Sv. 1958.
 Panz. Fn. Germ. 51. tab. 20.
 Frisch. Inf. 8. tab. 4.
 Habitat in Gallopavonibus.
- Gallinae.* 47. P. thorace capiteque utrinque mucronatis. Ent.
 syst. 4. 423. 39. Linn. syst. Nat. 2. 1020.
 32. Fn. Sv. 1959.
 Geoff. Inf. 2. 601. 11.
 Panz. Fn. Germ. 51. tab. 21.
 Schrank Beytr. 114. 3.
 Habitat in Gallinis domesticis. Pellitur Pipere.
- Phasiani.* 48. P. capite ovato magno, abdomine globose ob-
 tufo. Ent. syst. 4. 423. 40.*
 Red. Oper. 1.
 Habitat in Phasiano.
- Caponis.* 49. P. abdomine margine nigro. Ent. syst. 4. 423.
 41. Linn. syst. Nat. 2. 120. 33. Fn. Sv. 1960.
 Geoff. Inf. 2. 601. 10.
 Red. Exper. tab. 16. fig. 1.
 Frisch. Inf. 11. tab. 24.
 Habitat in Gallina domestica.
- Tetraonis.* 50. P. Tetraonis Tetricis. Ent. syst. 4. 424. 42.
 Linn. syst. Nat. 2. 1020. 34. Fn. Sv. 1961.
 Red. Exp. tab. 14.
 Habitat in Europae Tetraonibus.

51. P.

- §1. P. Tetraonis Lagopodis. Ent. syst. 4. 424. 43. *Lagopodis*.
 Linn. syst. Nat. 2. 1020. 35. Fn. Sv. 1962.
 Habitat in Tetraone Lagopode.
- §2. P. corpore filiformi ferrugineo postice clavato. *Columbas*.
 Ent. syst. 4. 424. 24. Linn. syst. Nat. 2.
 1020. 36. Fn. Sv. 1963.
 Geoff. Inf. 2. 599. 7.
 Panz. Fn. Germ. 51. tab. 22.
 Albin. Aran. tab. 43.
 Red. Exper. tab. 2. fig. 1.
 Habitat in *Columbis domesticis*.
- §3. P. pallide fuscus, abdomine albescente: macu- *Emberizae*.
 lis lateralibus fuscis, capite triangulo. Ent.
 syst. 4. 424. 45.
 Degeer Inf. 7. 74. 2. tab. 4. fig. 9.
 Geoff. Inf. 2. 599. 6.
 Habitat in *Emberizis*.
- §4. P. corpore ovato, cauda quadriseta. Ent. syst. *Pari*.
 4. 424. 46. Linn. syst. Nat. 2. 1020. 37.
 Frisch. Inf. 8. tab. 1. fig. 5.
 Schrank Beytr. 38. 17. tab. 1. fig. 36.
 Habitat in *Europae Paris*.
- §5. P. capite cordato rufo, abdomine albo basi *Motacillae*.
 attenuato. Ent. syst. 4. 424. 47.
Pediculus albiventris. Scopol. carn. 1051.
 Habitat in Motacillis.
- §6. P. pallescens abdomine albo nigro maculato. *Hirundinis*.
 Ent. syst. 4. 424. 48. Linn. syst. Nat. 2.
 1020. 38. Fn. Sv. 1963.
 Habitat in Hirundine apode.
- §7. P. sanguineus pedibus albis. Ent. syst. 4. 424. 49. *Gryllotal*.
Pediculus rostratus. Scopol. carn. 1052.
 Habitat in Acheta *Gryllotalpa*.

58. P.

Apis.

58. *P. filiformis ferrugineus*. Ent. syst. 4. 425.
50. Linn. syst. Nat. 2. 1020. 40.
Frisch. Inf. 8. tab. 16.
Habitat in Europae Apibus.

76. NYCTERIBIA. *Palpi* duo elongati, tri-articulati: articulo ultimo seta trifida.
Antennae nullae.

Vespertilio- 1. NYCTERIBIA.
nis.

- Acarus Vespertilionis*. Ent. syst. 4. 429. 22.
Linn. syst. Nat. 2. 1023. 9. Fn. Sv. 1941.

- Nycteribia Vespertilionis*. Latreille Dict. d'hist. nat. 24. 197. 599.

- Phthiridium Vespertilionis*. Hermann Apt. 120. 1.
tab. 5, fig. 1.
— — — — — Hermann Apt. 120. 2.
vix differt.

- Hippobosca Vespertilionis*. Voigt. Mag. 6. 5. 1.
tab. 10. fig. 4. 5.

- Scopol. carn. 1058.

- Frich. Inf. 7. tab. 7.

Habitat in Vespertilione murino.

Pedes omnino sex. In plano incedere haud valet.
Os parum prominens haustello palpisque absque proboscide. *Haustellum breve*, exsertum; reticulum, cylindricum: vagina bivalvi; valvulis aequalibus, corneis, obtusifusculis. *Setae tres* setaceae, corneae, acutiflumae. *Palpi* duo elongati, hirsuti, triarticulati: articulo primo brevi, secundo longiori, tertio seta trifida armato, ad basin haustelli inserti et intra haustelli vaginam latentes. *Antennae nullae.*

77. IXODES

77. IXODES. *Haustellum seta retrorsum aculeata*.
Palpi duo crassi, biarticulati.
Antennae nullae.

1. *I. orbicularis depressus cinereus fuso varius*, ca. *Rhinocerite* pedibusque brunneis.
rotis.

Habitat ad Cap. bon. spei. Mus. Dom. Lund.
Magnus in hoc genere. Caput brunneum, palpis compressis longitudine haustelli. Corpus depresso cinereum, fusco variegatum margine striato. Pedes ferruginei, immaculati.

2. *I. orbicularis depressus lividus*: macula baseos *Elephantinus*.
synt. Nat. 2. 1022. 1.

Schrank Beytr. 128 29. tab. 6. fig. 14. 15.
Habitat in India.

- Conf. *Acarus grossus*. Pall. spicil. zool. 9. 43.
tab. 3. fig. 42.

3. *I. globofo ovatus*: macula baseos rotundata. *Ricinus*.
Acarus ricinus. Ent. syst. 4. 425. 2. Linn. syst.
Nat. 2. 1023. 7. Fn. Sv. 1967.

Cynorrhætes Reduvius. Hermann Apt. 66. 3.
Ixodes Ricinus. Latreille Dict. d'hist. nat. 24.
136. 39.

Geoff. Inf. 2. 621. 1.

Degeer Inf. 7. 98. 4. tab. 5. fig. 16. 17.
Habitat in Bobus, Canibus frequens.

4. I.

Ixodis corpus parvum, ovatum, planum, depresso, immarginatum, glabrum, tardum, capite parvo, thoraci inserto, rotundato, oculis ovatis, lateralibus, antennis nullis, thorace cum abdomine connato, depresso, ovato, ano obtusissimo, pedibus octo brevibus, validis, incurvis: ungue arcuato, acutissimo.