

ENTOMOLOGIA PARISIENSIS;

S I V E

CATALOGUS Insectorum quæ in Agro
Parisiensi reperiuntur;

SECUNDUM methodum Geoffreanam in
sectiones, genera & species distributus:

CUI addita sunt nomina trivialia & fere trecentæ novæ
Species.

Edente A. F. DE FOURCROY, Dnæ.
Med. Parif.; & Reg. Scientiar. Academ.;
& Reg. Soc. Medic. &c.

PARS SECONDA.



M. DCC. LXXXV.

SUB PRIVILEGIO ACADEMIE.

1. C. pipines.

*Le Cousin commun.*Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. cinereus, abdomine annulis fuscis octo.

Loc. Habitat prata aquatica.

2. C. pulicaris.

*Le Cousin à trois taches sur les ailes.*Long. $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

C. alis maculis tribus obscuris, antennis apice bifurcatis.

Loc. Habitat sylvas & loca excelsa.

* 3. C. annulatus.

Le Cousin à pattes panachées.

Long.

C. fuscus, alis nervosis, pedibus albo intersectis.

Loc. Habitat adonides horti regii Parisiensis.

SECTIO SEXTA.

INSECTA APTERA.

CV. PEDICULUS. LE Pou.

Pedes sex.

Oculi duo.

Antennæ filiformes.

Abdomen simplex.

1. P. humanus.

Le Pou ordinaire.

P. humanus.

2. P. pubis.

Le Morpion.

P. inguinalis.

3. P. bovis.

Le Pou du bœuf à ventre chargé de huit bandes transverses.

P. bovis, abdomen lineis transversis octo ferrugineis.

4. P. vituli.

Le Pou du bœuf à ventre de couleur plombée.

P. bovis abdomen plumbeo.

5. P. circi.

Le Pou du busard.

P. circi, fuscus oblongus, abdomen fuscavescente, medio lateribusque fuscis.

6. P. passeris.

Le Pou du moineau franc.

Long. $\frac{3}{4}$ lig.

P. subflavescens, abdomen ovato, medio diaphano, maculâ fuscâ, lateribus punctato-ferrugineis.

7. P. columbae.

Le Pou du pigeon.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{5}$ lig.

P. oblongus, filiformis, albicans, corporis lateribus utrinque ferrugineis.

8. P. corvi.

Le Pou du corbeau.

Long. 1 lig.

P. albo nigroque varius, abdomen ovato oblongo, utrinque incisuris nigris.

9. P. meleagridis.

Le Pou du dindon.

P. galli-pavonis.

10. P. caponis.

Le Pou de la poule à ventre bordé de noir.

P. gallinæ, abdominis margine nigra.

11. P. gallinæ.

Le Pou de la poule à tête & coquille pointue des deux côtés.

P. gallinæ, thorace capiteaque utrinque mucronato.

12. P. pulsatorius.

Le Pou du bois.

P. ligni antiqui.

Pediculi Rhedi & Linnæi.

- 1°. *Pediculus accipitris*, abdomine oblongo.
 2°. *P. accipitris*, abdomine ovato.
 3°. *P. gruis.*
 4°. *P. fulicæ.*
 5°. *P. picæ.*
 6°. *P. ardæx.*
 7°. *P. ardeolæ.*
 8°. *P. cygni*, abdomine oblongo immaculato.
 9°. *P. cygni*, abdomine ovato utrinque lineis fuscis notato.
 10°. *P. lari.*
 11°. *P. anseris*, capite ovato, abdomine oblongo, incisuris utrinque maculatis.
 12°. *P. anseris*, capite triangulari, abdomine immaculato.

- 13°. *P. pluvialis*, abdomine margine simplici.
 14°. *P. pluvialis*, abdomine margine dentato serrato.
 15°. *P. querquedulæ.*
 16°. *P. falconis tinnunculi.*
 17°. *P. pavonis*, antennis dichotomis capite longioribus, abdomine utrinque immaculato.
 18°. *P. pavonis*, antennis simplicibus capite brevioribus, abdomine immaculato.
 19°. *P. sturni.*
 20°. *P. sternæ.*
 21°. *P. recurvirostræ.*
 22°. *P. hæmathopæ.*
 23°. *P. lagopi.*
 24°. *P. asini.*
 25°. *P. cervi*, abdomine fusco, medio albo.

26°. *P. cervi*, abdominis incisuris punctis nigris.

N. B. Adde pediculos animalium exocitorum.

CVI. PODURA, *LA PODURE*.

Pedes sex.

Oculi duo.

Antennæ filiformes.

Abdominis cauda bifurca inflexa saltatrix.

Corpus squamis tectum.

FAMIL. I. *Globulosæ*.

1. *P. signata*.

La Podure noirâtre à taches fauves sur le ventre.

Long. $\frac{3}{2}$ lig.

P. fusco-nigra, abdomine globoſo signaturis ferrugineis.

Loc. Habitat lapides humidos.

2. *P. viridis.*

La Podure verte aux yeux noirs.

Long. $\frac{3}{4}$ lig.

P. viridis, oculis nigris, capite flavescente, antennis in medio fractis.

Loc. Habitat plantas in mense aprilii.

3. *P. longicornis.*

La Podure brune enfumée.

Long. $\frac{3}{2}$ lig.

P. fusca non nitens, antennis longitudo corporis.

Loc. Habitat cortices arborum.

FAMILIA II. *Longæ.*

4. *P. communis.*

La Podure commune velue.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

P. fusco nigroque variegata villosa.

Loc. Habitat lapides humidos.

5. *P. livida.*

La Podure jaune à anneaux noirs.

Long. $\frac{1}{3}$ lig.

P. livido-lutea, annulis transversis nigris.

Loc. Idem.