

CAROLI LINNÉ
SYSTEMA
NATURÆ.

TOM. I. PARS V.

pulfato- 2. T. abdomine oblongo, ore rubro, oculis luteis, anten-
rium nis fefaceis. *Fn. succ.* 1957.* *Scop. ent. carn.* 1032.

Degcer inf. 7. p. 41. n. 1. t. 4. f. 1. *Termes lignorum.*
Fabr. sp. inf. 1. p. 394. n. 15. *mant. inf.* 1. p. 248.
n. 19. *Hemerobius pulfatorius.*

Raj. inf. 8.

Derham theol. 119.

Blank. belg. 169. t. 14. f. F.

Bradt. nat. t. 27. f. 3.

Ad. angl. 270. p. 231. 291.

Roland. ad. Stockh. 1754. p. 152.

Geoffr. inf. par. 2. p. 601. n. 12.

Sulz. inf. t. 22. f. 144.

hist. inf. t. 28. f. 3.

Schaeff. elem. t. 126.

Habitat in Europa & America, frequens in domibus;
invisum vestibus; herbariis, insectorum museis, libris,
a glutine farinaceo allecūm: Pupa horologii instar in
festucis pulfat.

livinato- 7. T. abdomine transversim sulcato, ore fusco, oculis
rium nigris. *Müll. zool. dan. prodr.* 2179. *O. Fabr. fn. groenl.*
p. 214. n. 181.

Habitat in libris, vivacissimum, irritabile, albicans.

264. PEDICULUS. Os haustello retractili, recurvo,
proboscide palpisque nullis.
Antennæ longitudine thoracis.

Oculi duo.

Abdomen depressum, sublo-
batum.

Pedes sex ambulatorii.

humanus, 1. P. abdomine lobato cinereo. *Fn. succ.* 1939. *Fabr. sp.*
inf. 2. p. 476. n. 1. *mant. inf.* 2. p. 368. n. 1.

Mouff. inf. 259.

Red. exper. t. 18.

oper. t. 25.

Swammerd. bibl. nat. t. 1. f. 3-6.

Albin. aran. t. 42.

Bonann. microgr. f. 55.

Baker microscop. t. 13. f. 4.

Joblot microscop. I. pp. I. t. 1.

Ledermüll. microscop. 45. t. 21.

Sulz. inf. t. 22. f. 145.

Schaeff. elem. t. 95.

Schranck Beytr. p. 112. n. 1.

Habitat in capite (durior magis coloratus) & vestimentis
hominum, gulosis pueris frequentissimus morbos aver-
tens, æstu, gelu, hydrargyro, pinguicula, lycopodio,
ledo, pipere, croco, lauri, angelicæ, apii, rutæ,
menispermi, staphisagriæ, veratri semine occidendus.

pubis. 2. P. abdomine posterius emarginato, pedibus cheliformi-
bus. *Fn. succ.* 1940. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 476. n. 2.
mant. inf. 2. p. 368. n. 2.

Mouff. inf. 200.

Raj. inf. 8.

Schenck obs. 676.

Red. exp. t. 19. f. 1.

Pet. zætoph. t. 67. f. 9.

Hospitatur in hominis immundi pube, rarius in super-
ciliis, tabaci oleo, mercurialibus pellendus, antenna-
rum articulis 5, abdomine posterius piloso.

vicinoides. 3. P. abdomine orbiculato: linea alba, scutello trilobo,
rostro albo.

Habitat in America, obambulantium pedes intrans san-
guinemque hauriens, in iis ova deponens, & ulcera
maligna causans, rufescens, rostro cylindrico longa
subtus hamulis armato. Rolander.

suus. 4. P. suis Scrofa. *Fn. succ.* 1942.

Habitat in suis.

porcelli. 5. P. Cobayæ. *Fn. succ.* 1943.

Habitat in Cavia Copaya.

cameli. 6. P. ferrugineus, capite porrecto acuminato, abdomine
ovato. *Fabr. sp. inf.* 2. p. 477. n. 4. *mant. inf.* 2.
p. 368. n. 4.

Red. exper. t. 22.

oper. t. 25.

Pediculi succo animalium viditantes plures etiamnum non observati, minus des-
cripti, multo minus differentia determinati exsunt, larva pupaque hexa-
pode, agili, currens, imaginis simillima.

INSECTA APTERA. Pediculus;

- 167
- Albin. aran. 76. t. 51.*
Habitat in Africa camelis.
- cervi;** 7. *P. cervi. Fn. succ. 1944. Fabr. sp. inf. 2. p. 477. n. 5. mant. inf. 2. p. 368. n. 5.*
Red. exper. t. 5.
Frisch inf. 12. t. 5.
Habitat in cervis, elapho, dama, capreolo.
- ovis.** 8. *P. ovis arietis. Fn. succ. 1945. Fabr. mant. inf. 2. p. 368. n. 6.*
Red. exper. t. 22. f. 1.
Habitat in ovibus.
- bovis.** 9. *P. abdomine lineis transversis octo ferrugineis. Fn. succ. 1946.* Fabr. sp. inf. 2. p. 477. n. 7. mant. inf. 2. p. 368. n. 8.*
Habitat in Europæ bobus, decocto ledi sedique acris pellendus.
- bubali.** 41. *P. flavescens: striis fuscis obscuris, abdomine tuberculis decem conicis marginalibus. Degeer inf. 7. p. 68, n. 3. t. 1. f. 11. 12. Fabr. sp. inf. 2. p. 477. n. 6. mant. inf. 2. p. 368. n. 7.*
Habitat ad Caput bonæ spei in bubalis, humano paula minor.
- vituli.** 10. *P. abdomine acuminato plumbeo. Fn. succ. 1947. Fabr. sp. inf. 2. p. 478. n. 8. mant. inf. 2. p. 368. n. 9.*
Habitat in Europæ bobus.
- equi.** 11. *P. equi caballi. Fn. succ. 1948. Fabr. sp. inf. 2. p. 478. n. 9. mant. inf. 2. p. 368. n. 10.*
Habitat in Europæ equis.
- asinis.** 12. *P. capite porrecto obtuso, abdomine ovato fusco striato. Fabr. sp. inf. 2. p. 478. n. 10. mant. inf. 2. p. 369. n. 11.*
Alb. aran. 76. t. 51.
Red. exper. t. 22. f. 1.
oper. t. 25.
Habitat in Europæ magis australis asinis.
- vulturis.** 42. *P. oblongus, abdomine fusco: lineis duabus flavescens. Fabr. sp. inf. 2. p. 478. n. 11. mant. inf. 2. p. 369. n. 12.*
Habitat in Indiæ vulturibus.
- Manuncus.** 13. *P. capite sagittato posterius utrinque mucronato. Fn. succ. 1949.* Fabr. sp. inf. 2. p. 478. n. 12. mant. inf. 2. p. 369. n. 13.*

INSECTA APTERA. Pediculus

291

- Albin. aran. t. 43.*
Red. exper. t. 13.
Frisch inf. 11. p. 24. t. 24.
Habitat in tinnunculis aliisque falconibus.
- buteonis.** 43. *P. abdomine marginato: segmentis utrinque punctis duobus impressis. Fabr. sp. inf. 2. p. 478. n. 13. mant. inf. 2. p. 369. n. 14.*
Scop. ent. carn. 1036. Pediculus maximus.
Habitat in buteone.
- strigis.** 44. *P. abdomine ovato albo: margine pedibusque rubris. Fabr. sp. inf. 2. p. 478. n. 14. mant. inf. 2. p. 369. n. 14.*
Scop. ent. carn. 1035. Pediculus hæmatopus.
Habitat in strigibus, falconibus.
- corvi.** 14. *P. abdomine ovato: margine striato. Fn. succ. 1950.* Fabr. sp. inf. 2. p. 479. n. 15. mant. inf. 2. p. 369. n. 16.*
Degeer inf. 7. p. 76. n. 3. t. 4. f. 11. Pediculus cornicis.
Red. exper. t. 16. f. 2.
oper. t. 14.
Geoffr. inf. par. 2. p. 600. n. 8.
Habitat in corvis.
- cornicis.** 45. *P. abdomine ovato pallido: maculis lateralibus nigris; pupilla alba. Fabr. sp. inf. 2. p. 479. n. 16. mant. inf. 2. p. 369. n. 17.*
Scop. ent. carn. 1038. Pediculus ocellatus.
Habitat in cornice.
- infausti.** 15. *P. thorace angustato, abdomine ovato pallido diaphano. Fn. succ. 1951.* Fabr. sp. inf. 2. p. 479. n. 17. mant. inf. 2. p. 369. n. 18.*
Habitat in lanio infausto.
- pica.** 16. *P. capite obtuso fusco: punctis quatuor nigris. Fabr. sp. inf. 2. p. 479. n. 18. mant. inf. 2. p. 369. n. 19.*
Albin. aran. 76. t. 45.
Red. exper. t. 5.
Habitat in corvo pica.
- prioli.** 49. *P. albus, abdomine lineæ dorsali fusca. Fabr. sp. inf. 2. p. 479. n. 19. mant. inf. 2. p. 369. n. 20.*
Scop. ent. carn. 1039. Pediculus dolichocephalus.
Habitat in coracia, oriolo.

- cuculi. 47. *P. abdomine oblongo albido fusco fasciato. Fabr. sp. inf. 2. p. 479. n. 20. mant. inf. 2. p. 369. n. 21. Scop. ent. carn. 1020. Pediculus fasciatus. Habitat in cuculo canoro.*
- cygni. 17. *P. capite emarginato, abdomine ovato: margine nigro striato. Fabr. sp. inf. 2. p. 480. n. 21. mant. inf. 2. p. 369. n. 22. Albin. aran. 76. t. 58. Red. oper. t. 20. Habitat in cygno.*
- anferis. 18. *P. filiformis pallidus, margine nigro punctato. Fn. succ. 1952.* Fabr. sp. inf. 2. p. 480. n. 22. mant. inf. 2. p. 369. n. 23. Albin. aran. 76. t. 58. Red. exper. t. 10. Habitat in anferibus feris cicuribusque, pipere pellendus.*
- moschata. 19. *P. anatis moschata. Red. exper. t. 9. f. 1. Habitat in anate moschata.*
- querquedula. 20. *P. anatis querquedula. Red. exper. t. 12. Habitat in querquedula.*
- mergi. 48. *P. albidus, capite flavescente, corpore elongato. Fabr. sp. inf. 2. p. 480. n. 23. mant. inf. 2. p. 369. n. 24. Degeer inf. 7. p. 78. n. 5. t. 4. f. 13. Ricinus mergi ferrati. Habitat in mergis ferratis.*
- procellaria. 49. *P. elongatus filiformis fuscus, pedibus pallidis. Fabr. sp. inf. 2. p. 480. n. 24. mant. inf. 2. p. 369. n. 25. Habitat in Brasiliæ procellariis.*
- vagelli. 50. *P. ovatus pallidus, thorace lineis duabus fuscis. Fabr. mant. inf. 2. p. 369. n. 26. Habitat in procellaria glaciali, magnus.*
- diomedæ. 51. *P. albus, abdominis lateribus nigris, capite obtuso. Fabr. sp. inf. 2. p. 480. n. 25. mant. inf. 2. p. 369. n. 27. Habitat in Brasiliæ diomedæis.*
- sternæ. 21. *P. capite trigono, abdomine ovato pallido: dorso longitudinaliter nigricante. Fn. succ. 1953.* Fabr. sp. inf. 2. p. 480. n. 26. mant. inf. 2. p. 369. n. 28.*

- Degeer inf. 7. p. 77. n. 4. t. 4. f. 12. Ricinus laris. Red. exper. t. 9. f. 2. Habitat in sternis, laris.*
- plataleæ. 22. *P. plataleæ leucorrhodiæ. Fabr. mant. inf. 2. p. 370. n. 29. Red. exper. t. 4. Habitat in leucorrhodiis.*
- ardeæ. 23. *P. ardeæ cinereæ. Fabr. mant. inf. 2. p. 370. n. 30. Red. exper. t. 6. Habitat in ardeis.*
- gruis. 24. *P. abdomine subclavato pallido: spiraculis niveis. Fn. succ. 1954. Fabr. sp. inf. 2. p. 481. n. 27. mant. inf. 2. p. 370. n. 31. Red. exper. t. 3. oper. t. 19. Frisch inf. 5. p. 15. t. 4. Habitat in gruibus.*
- ciconiæ. 25. *P. elongatus filiformis, abdomine albo: lateribus nigro punctatis. Fn. succ. 1955. Fabr. sp. inf. 2. p. 481. n. 28. mant. inf. 2. p. 370. n. 32. Frisch inf. 8. p. 9. t. 6. Habitat in ciconiis.*
- charadrii. 26. *P. charadrii pluvialis. Fabr. mant. inf. 2. p. 370. n. 33. Red. exper. t. 9. Habitat in charadriis.*
- fulicæ. 27. *P. fulicæ atræ. Fabr. mant. inf. 2. p. 370. n. 34. Red. exper. t. 4. Habitat in fulica atra.*
- recurvirostræ. 28. *P. oblongus fuscus, capite trigono canaliculato. Fn. succ. 1956.* It. oeland. 90.* Fabr. sp. inf. 2. p. 481. n. 29. mant. inf. 2. p. 370. n. 35. Habitat in recurvirostris.*
- hæmatopodis. 29. *P. glaucus, thorace angustissimo, abdomine ovato: incisuris pallidis. Fn. succ. 1957.* Fabr. sp. inf. 2. p. 481. n. 30. mant. inf. 2. p. 370. n. 36. Habitat in hæmatopode ostralega.*
- pavonis. 30. *P. capite globoso maximo, corpore pallido fuscoque striato. Fabr. sp. inf. 2. p. 481. n. 31. mant. inf. 2. p. 370. n. 37. Albin. aran. 76. t. 47.*

- Frisch inf. t. 3. f. 6.*
Red. exper. t. 15.
oper. t. 23.
Geoffr. inf. par. 2. p. 600. n. 9.
Habitat in pavonibus.
- meleagri- 31. *P. capite trigono obtuso, abdomine ovato griseo. Fn. succ. 1958.* Fabr. sp. inf. 2. p. 482. n. 32. mant. inf. 2. p. 370. n. 38.*
Frisch inf. 8. t. 4.
Habitat in gallopavonibus.
- gallinae. 32. *P. thorace capiteque utrinque mucronatis. Fn. succ. 1959.* Fabr. sp. inf. 2. p. 482. n. 33. mant. inf. 2. p. 370. n. 39.*
Geoffr. inf. par. 2. p. 601. n. 11.
Schranck Beytr. p. 114. n. 3.
Habitat in gallinis cicuribus, pipere pellendus.
- phasiani. 52. *P. capite ovato magno, abdomine globoso obtuso. Fabr. sp. inf. 2. p. 482. n. 34. mant. inf. 2. p. 370. n. 40.*
Red. oper. 1.
Habitat in phasiano Motmot.
- aponis. 33. *P. abdominis margine nigro. Fn. succ. 1960.* Fabr. sp. inf. 2. p. 482. n. 35. mant. inf. 2. p. 370. n. 41.*
Red. exper. t. 16. f. 1. Pulex capi.
Frisch inf. 11. t. 24. Pediculus galli.
Geoffr. inf. par. 2. p. 601. n. 10.
Habitat in gallina cicure.
- tetraonis. 34. *P. tetraonis tetricis. Fn. succ. 1961.* Fabr. mant. inf. 2. p. 370. n. 42.*
Habitat in tetraonibus.
- lagopodis. 35. *P. tetraonis lagopodis. Fn. succ. 1962.* Fabr. mant. inf. 2. p. 371. n. 43.*
Habitat in tetraonibus lagopodibus.
- colum- 36. *P. corpore filiformi ferrugineo posteriorius clavato. Fabr. sp. inf. 2. p. 482. n. 36. mant. inf. 2. p. 371. n. 44.*
Albin. aran. t. 43.
Red. exper. t. 2. f. 1. -
Geoffr. inf. par. 2. p. 599. n. 7.
Schranck Beytr. p. 114. n. 4. t. 5. f. 3.
Habitat in columbis domesticis.

- emberizae. 53. *P. pallide fuscus, abdomine albescente: maculis lateralibus fuscis, capite triangulo. Fabr. sp. inf. 2. p. 483. n. 37. mant. inf. 2. p. 371. n. 45.*
Degeer inf. 7. p. 74. n. 2. t. 4. f. 9. Ricius emberizae.
Habitat in Europæ emberizis.
- pari. 37. *P. corpore ovato, cauda quadrifeta. Fabr. sp. inf. 2. p. 483. n. 38. mant. inf. 2. p. 371. n. 46.*
Schranck Beytr. p. 38. n. 17. t. 1. f. 36. Acarus ovatus pallidus, &c.
Habitat in Europæ paris, nonne potius acaris accensendus?
- motacillae. 54. *P. capite cordato rufo, abdomine albo basi attenuato. Fabr. sp. inf. 2. p. 483. n. 39. mant. inf. 2. p. 371. n. 47.*
Scop. ent. carn. 1051. Pediculus albiventris.
Habitat in motacilla troglodyte.
- hirundinis. 38. *P. pallefcens, abdomine albo nigro maculato. Fn. succ. 1963.* Fabr. sp. inf. 2. p. 483. n. 40. mant. inf. 2. p. 371. n. 48.*
Habitat in hirundine apode, abdomine obovato: lateribus setosis; setis posterioribus majoribus.
- farionis. 39. *P. salmonis farionis. Fn. succ. 1964.**
Habitat in salmonæ farione maris norwegici, viz hujus generis.
- gryllotalpae. 55. *P. fanguineus, pedibus albis. Fabr. sp. inf. 2. p. 484. n. 41. mant. inf. 2. p. 371. n. 49.*
Scop. ent. carn. 1052. Pediculus rostratus.
Habitat in gryllotalpa.
- apis. 40. *P. filiformis ferrugineus. Fabr. sp. inf. 2. p. 484. n. 42. mant. inf. 2. p. 371. n. 50.*
Frisch inf. 8. t. 16.
Habitat in Europæ apibus.
- musculi. 56. *P. albus, thorace magno posteriorius bilobo, abdomine sinuato dentatoque. Schranck inf. austr. p. 501. n. 1024.*
Habitat in mure musculo, minimus diaphanus, pilorum bulbis senacillime affixus.
- anatis. 57. *P. albidus, thoracis segmento primo orbiculari utrinque truncato, altero abdomineque lineari elongatus. Schranck inf. austr. p. 503. n. 1026.*
Habitat in anate boschade fera.

- ortygo- 58. *P. oblongus*, capite cordato, thorace angusto, abd-
metræ, dominis segmentis setosis; spiraculis utrinque maculatis
magnis. *Schranck inf. austr. p. 503. n. 1027.*
Habitat in rallo crex dicto.
- alaudæ. 59. *P. alaudæ arvensis*. *Schranck Beytr. 1. Naturg. p. 115.*
inf. austr. p. 506. n. 1032.
Habitat in alauda arvensi.
- sturni. 60. *P. sturni vulgaris*. *Schranck Beytr. 1. Naturg. p. 118.*
inf. austr. p. 506. n. 1033.
Habitat in sturno vulgari.
- curvirof- 61. *P. loxiæ curvirostræ*. *Schranck Beytr. 1. Naturg.*
træ. *p. 117. inf. austr. p. 506. n. 1034.*
Habitat in loxia curvirostra.
- pyrrhu- 62. *P. loxiæ pyrrhulæ*. *Schranck Beytr. 1. Naturg. p. 117.*
læ. *inf. austr. p. 506. n. 1035.*
Habitat in loxia pyrrhula.
- chlori- 63. *P. loxiæ chloridis*. *Schranck Beytr. 1. Naturg. p. 118.*
dis. *inf. austr. p. 506. n. 1036.*
Habitat in loxia chloride.
- citrinell- 64. *P. emberizæ citrinellæ*. *Schranck Beytr. 1. Naturg.*
læ. *p. 116. inf. austr. p. 507. n. 1037.*
Habitat in emberiza citrinella.
- curruçæ. 65. *P. motacillæ curruçæ*. *Schranck Beytr. 1. Naturg.*
p. 113. inf. austr. p. 507. n. 1038.
Habitat in motacilla curruça.
- rubecu- 66. *P. motacillæ rubeculæ*. *Schranck Beytr. 1. Naturg.*
læ. *p. 115. inf. austr. p. 37. n. 1039.*
Habitat in motacilla rubecula.

265. PULEX. *Os palpis maxillisque carens, rostro elongato, inflexo, basi laminis duabus ovatis tecto, vagina bivalvi, quinquearticulata: seta unica, labio rotundato, aculeis reflexis ciliato.*

Antennæ porrectæ, moniliformes; extrorsum crassiores.

Oculi duo.

Abdomen compressum.

Pedes sex saltatorii.

irritans. 1. *P. rostro corpore brevior. Fn. suec. 1695.* Scop. ent. carn. 1055. Fabr. sp. inf. 2. p. 383. n. 1. mant. inf. 2. p. 314. n. 1.*

Raj. inf. 7.

Albin. man. t. 41.

Bonann. microgr. f. 56.

Joblot microgr. 1. p. 1. t. 3.

Hook microgr.

Anon. angl. p. 204. f. 12.

Frisch inf. 11. p. 8.

Valisn. op. 1. t. 25. f. 1.

Leeuwenh. epist. 76. f. 1-20.

Roes. inf. 2. musc. t. 2-4.

Baker microsc. t. 13. f. 6.

Ledermüll. microsc. 4. t. 20.

Geoffr. inf. par. 2. p. 616. n. 1.

Sulz. inf. t. 22. f. 146.

Schaeff. elem. t. 105.

Habitat ubique in Europa, & America sanguisugus, leporibus potissimum molestus; hinc a Dalecarlis ranienio vestimenti leporini capitur & avertitur, satireja, pulegio, persicaria, coula; alno, ut fertur; pellendus.

Ralicis genus ambiguum multis notis ad hemiptera accedit; succo sanguineque animalium & quibuslibet videtur; mas minor sub femina huic jungitur; larva apus, cylindrica, agilis; spinis duabus cylindricis subcaudalibus; pupa quiescens immobilis imagini simillima.