ЛИТЕРАТУРА

Родендорф Б. Б. Семейство Sarcophagidae. Фауна СССР. Насекомые двукрылые. Т. 19, вып. 1. М.—Л., 1937, с. 178—179, 185—189.

Kurahashi Hiromu. Studies on the Calipterate Muscoid Flies from Japan, IX. Subfamily Agriinae (Diptera: Sarcophagidae). — Kontyû, 1973, vol. 43, N 2, p. 206—207.

A DESCRIPTION OF THE FEMALES OF THREE SPECIES SARCOPHAGIDS (DIPTERA, SARCOPHAGIDAE) FROM SOUTHERN PRIMORYE

S. D. Artamonov

A description of formely unknown females of three species of Sarcophagids distributed on the territory of Southern Primorye: *Agria monachae* (Kram.), *Pierretia villeneuvei* (Böttc.) and *Beleriomima stackelbergi* (Rohd.) is given. Morpholegical features are defined according to which *A. monachae* (Kram.) differs from the other representatives of the genus *A. mamillata* (Pand.) and *A. affinis* (Fll.).

A DESCRIPTION OF NEW SPECIES AMYRSIDEA EWING (MALLOPHAGA, SOMAPHANTIDAE)

I. A. Fedorenko, T. T. Vasjukova

The paper contains a description of new species *Mallophaga*: *Amyrsidea jacutica* Fed. et Vas., sp. n. found on Tetrao parvirostris Bp.

Н. А. ФЕДОРЕНКО, Т. Т. ВАСЮКОВА

ОПИСАНИЕ НОВОГО ВИДА AMYRSIDEA EWING (MALLOPHAGA, SOMAPHANTIDAE)

Нами на каменном глухаре (Tetrao parvirostris Br.) обнаружены пухоеды рода *Amyrsidea*, которые отличаются от описанных ранее с других видов тетеревиных птиц и представляют новый вид. Приводим его описание.

Amyrsidea jacutica Fedorenko et Vasjukova, sp. n.

Самка. Общая окраска тела буро-коричневая. Голова шестиугольная, ее ширина меньше двойной длины (отношение ширины к длине около 1,7), с четкими предглазничными щечками (см. рисунок, *а*); орбитальный синус почти целиком занят глазом, глаза хорошо развиты, двулинзовые, выпуклые; лоб параболический; затылок вогнутый с черно-коричневой затылочной полоской и 6 длинными щетинками. Усики с удлиненным последним члеником (см. рисунок, *б*), который пигментирован значительно интенсивнее остальных. Горловая пластинка голая, сзади округленная, на ее боковых краях по 4 длинных щетинки с каждой стороны.

Переднегрудь с тупыми боковыми углами, каждый из которых с 2 короткими шипами (см. рисунок, *а*), задний край переднегруди выпуклый, с 8 длинными краевыми щетинками. Среднегрудь с сильно расходящимися боковыми сторонами, ее задний край очень слабовыпуклый. Граница сочленения переднегруди и заднегрудного комплекса сравнительно узкая. Бедра 3-й пары ног на вентральной поверхности с густыми скоплениями из 27—28 коротких щетинок.

Брюшко удлиненно-овальное с плоско округленным последним сегментом. Тергиты с широкими поперечными буро-коричневыми полосками, с заднекрайним рядом длинных щетинок. Стерниты с заднекрайним и передним рядами щетинок, с выраженными боковыми скоплениями мелких шиповидных щетинок на III — VI стернитах. Плейриты коричневые, с заднекрайним рядом длинных щетинок и редкими шиповидными щетинками на срединном поле. Длина тела 2,37—2,54 мм (измерено 5 ♀♀).

Самец. Немного меньше самки. Форма тела, дорсальная и вентральная хетотаксия сходны с таковыми самки. Отноше-



Amyrsidea obstinata Eichler et Vas. (♂)
а — голова и грудь, *б* — передняя часть [illegible]
в — [illegible] с передними [illegible]

ние ширины головы к ее длине 1,7. Брюшко овальное с хорошо округленным последним сегментом. Гениталиевый аппарат около 0,48 мм длины, по строению близок к такому *Amyrsidea obstinata* Zlot.; парамеры и эндомеры тонкие, длинные (см. рисунок, *в*), почти одинаковой длины.

Длина тела 2,06—2,13 мм (измерено 2 ♂♂).

Материал. Голотип — самка, с одного каменного глухаря, Коблёнский р-н Якутской АССР, 5 IV 1976 (Шустов). Паратипы — 6 ♀♀, 2 ♂♂. С одного каменного глухаря, Орджоникидзевский р-н Якутской АССР, 19 X 1978 (Васюков).

Голотип хранится в коллекции пухоедов Института зоологии АН УССР, паратипы — в коллекции Института биологии ЯФ СО АН СССР.

Систематические замечания. На куриных родов Tetrao известен *Amyrsidea latissimata* (Piaget), паразитирующий на обыкновенном глухаре — Tetrao urogallus L. *Amyrsidea jacutica* Fed. et Vas. Отличается от него большими размерами тела, формой и тупыми боковыми углами переднегрудки, по ряду признаков он напоминает *A. obstinata* Zlot., который паразитирует на тетереве — Lyrurus tetrix (L.). Однако его легко отличить по узкой границе сочленения переднегрудки и заднегрудного комплекса.