

UN NOUVEAU PARASITE DU TRANSVAAL,

PAR

E. PIAGET.

Physostomum Longetarsatum.

La tête un peu plus large que longue se rétrécit en avant de la cavité antennale; les tempes déjetées, angulaires et soyeuses; l'occiput rentrant et *droit* avec une forte bande transverse; les bandes occipitales effilées et noirâtres rejoignent les antennales *qui se prolongent élargies, jusqu'au bord antérieur de la tête*; les mandibules *fortes*, en avant desquelles se voit la bande transversale qui limite la cavité buccale et dont la partie médiane *forme un arc* presque parallèle au bord antérieur de la tête; les antennes et les palpes ont la forme ordinaire au genre. A la face inférieure on distingue *une bande noirâtre en ménisque*, limitant en arrière la grande cavité buccale.

Le thorax composé de deux articles: un prothorax soyeux, angulaire latéralement, avec une forte *bande médiane en fer de cheval* et deux bandes latérales en avant; un métathorax en cloche, droit sur l'abdomen avec deux fortes bandes latérales.

A la face sternale *deux taches subrectangulaires*, isolées l'une de l'autre: celle du prothorax terminée par une bande noirâtre, ondulée, s'avancant obliquement jusqu'aux bords latéraux, celle du métath. accompagnée d'une petite bande de chaque côté.

Les pattes robustes; le fémur plus long que le tibia, bordé d'une bande noirâtre à l'extérieur et à l'intérieur; le tibia recourbé à la base, claviforme, avec de longues et fines soies à l'extrémité; les palettes *larges* et triangulaires; le *second tarse plus long* que

dans les autres espèces du genre, recourbé et portant deux forts ongllets crochus.

L'abdomen continue exactement le métath., subelliptique, le plus large au 6e segment, nu sauf aux angles des segments, avec une forte bande latérale; le 9e segment largement arrondi, avec de courtes soies; la vulve tenant toute la largeur du segment, concave au milieu, bordée de courts poils, *précédée de deux taches* larges, peu prononcées et terminées en avant en pointe très aiguë.

Dimensions: longueur totale 7 mm.

longueur tête	0.00135	largeur	0,00140
» thorax	160	»	185
» abd.	410	»	190
3e fémur	126		
3e tibia	085		
2e tarse	020		

Je ne connais pas le mâle; le parasite provient vraisemblablement d'un Lamprotornis.

Provient du Transvaal (Mr. SCHUIJT).