

Bol. Entom. Venez.
9:55: 1954.

805.

HETERODOXUS SPINIGER (Enderlein), MALOFAGO

PARASITO DEL CANINO (*Canis fam.*)

DE VENEZUELA

E. G. VOGELSANG

Describí en 1939 entre los artrópodos parásitos de nuestros animales domésticos de Venezuela, la presencia de este interesante malófago parasitando el canino (*Canis fam.*). Erróneamente según la opinión de la época, lo describí como *Heterodoxus longitarsus* (Piaget, 1880).

Gracias a la amabilidad del Dr. Flavio L. Werneck del Instituto Oswaldo Cruz, de Río de Janeiro, el cual revisó nuestro material podemos rectificar nuestro error.

Trátase del *Heterodoxus spiniger* (Enderlein), el cual fué por largo tiempo confundido por los especialistas y descrito frecuentemente como *H. longitarsus* (Piaget, 1880). Las especies del género *Heterodoxus* se diferencian entre sí por características particulares en la vesícula peniana. Stafford (1943) describe la presencia de *Heterodoxus spiniger* (Enderlein) de material de canino (*Canis fam.*) enviado de Venezuela por P. J. Anduze para su clasificación. Este malófago se halla muy expandido entre nuestros caninos y estos huéspedes son a menudo parasitados por grandes cantidades de ellos. El primer caso por nosotros observado, lo fué en un canino de Aguas Calientes (Edo. Carabobo) el cual se hallaba en un estado bastante precario de nutrición y parasitado por centenares de ese malófago.

Tenemos en nuestra colección este malófago de caninos de Caracas; Maracay (Edo. Aragua) y, últimamente de Elorza (Edo. Apure), colectado por el Dr. M. Nussias.

L I T E R A T U R A

- STAFFORD, E. W. (1943).—Bol. de Entomología Venezolana. Vol. II, N° 1. Caracas.
- VOGELSANG, E. G. (1931).—Rev. Med. Vet. y Paras. Vol. I, Nos. 2-4. Caracas.
- WERNECK, F. L. (1941).—Rev. Bras. de Biología. Vol. I, N° 1, pp. 47-55. Río de Janeiro.
- WERNECK, F. L. (1948).—Os Malófagos de Mamíferos. Part. 1. Río de Janeiro.