

Descriptions of Trichodectes climax and limbatus.

Histoire Naturelle des Insectes Aptères. Gervais, Tom. 3, 1844,  
pp.313-314. Pls.48, figs. 3 & 4.

p.313. Trichodecte climax. (Trichodectes climax)  
(Pl.48,fig.3.)  
Trich.clim. Nitzsch, Thierins.,p.38.

Parasite de la Chèvre domestique (Capra aegagrus domest.)  
Nitzsch n'en a pas publié de description. J'ai trouvé, sur des  
Chèvres, deux espèces de ces animaux, celles figurées dans notre  
atlas sous le nom de Tr. élargi et bordé.

Trichodecte bordé. (Tr. limbatus.)  
(Pl.48,fig.4.)

Corps ovalaire, assez mou, mais avec des pièces endurcies, une  
de chaque côté et une en bande transversale sur le milieu des  
anneaux en dessus; thorax de deux articles; huit pour l'abdomen;  
poils nombreux, courts, ranges en lignes sur les anneaux  
L'autre Trichodecte (Tri. climax ?) a le corps plus élargi,  
plus consistant; mais sans endurcissement partiel des anneaux;  
p.314 le premier article, dans les antennes du mâle, est plus gros que  
les autres.

Ces deux espèces vivaient sur des Chèvres d'Angora: je ne les  
ai pas trouvées sur le même individu.

