

# MALLOPHAGA

RICARDO N. ORFILA

Jefe de la Sección Entomología, Museo Argentino de Ciencias Naturales

Esta lista de Mallophaga se ha confeccionado teniendo en cuenta que para estos ectoparásitos el animal huésped constituye la "patria".

Con ese criterio han sido incluidos todos los Mallophaga descriptos de aves procedentes de la Argentina o encontrados en aves argentinas o señalados en aves que integran la avifauna argentina.

Para considerar su posible función epidemiológica remito a la síntesis que, bajo el nombre "Importancia epidemiológica de los Mallophaga aparece en este mismo tomo.

La sistemática de los huéspedes es la actual. Para aves se ha seguido la establecida por Peters en su "Check - list of the Birds of the World". En los grupos a que el catálogo de Peters no ha llegado se sigue a Hellmayr, y en algunos casos, trabajos especiales posteriores.

La nomenclatura de los Mammalia también está de acuerdo a los últimos trabajos efectuados y, por no existir una obra de conjunto sobre la clase, sólo es posible indicar como referencia concreta que para Rodentia, sin duda alguna el orden que tiene mayor importancia en relación con estos ectoparásitos, se ha seguido la excelente monografía de Ellerman.

En ningún caso se ha dado indicación bibliográfica de la descripción original de las especies porque así fué concebida esta lista, pero quienes necesiten obtenerla la encontrarán en la excelente obra de Hopkins y Clay "A Check list of the Genera and Species of Mallophaga" y en su "Additions and Corrections to the Check List of Mallophaga", que llegaron a mi poder antes de presentar esta lista y han permitido completarla, dando a cada especie su correcta posición genérica.

## FAMILIA MENOPONIDAE Mjöberg, 1910

GENERO *Actornitophilus* Ferris, 1916

*albus* Emerson, 1948.

Hab.: *Crocethia alba* (Pallas)

- *bicolor* (Piaget) 1880.

Hab.: *Arenaria interpretes morinella* (L.)

- *flavines* (Giebel) 1874.  
Hab.: *Squatarola squatarola* (L.)
- *juscipes* (Piaget) 1880.  
Hab.: *Larus dominicanus* Lichtenstein
- *grandiceps* (Piaget) 1880.  
Hab.: *Haematopus ostralegus pitanay* Murphy
- *morsitans* (Kellogg & Mann) 1912.  
Hab.: *Erolia melanotos* (Vieillot)
- *timidus* (Kellogg) 1896.  
Hab.: *Pluvialis dominica dominica* (Müller)
- *umbrinus* (Burmeister) 1838.  
Hab.: *Erolia testacea* (Pallas)

GENERO *Ancistrona* Westwood, 1874

- *procellariae* Westwood, 1874.  
Hab.: *Daption capense* (L.)

GENERO *Austromenopon* Bedford, 1939

- *lemniscatum* (Enderlein), 1908.  
Hab.: *Larus dominicanus* Lichtenstein
- *ridibundus* (Denny), 1842.  
Hab.: *Larus ridibundus maculipennis* Lichtenstein

GENERO *Ciconiphilus* Bedford, 1939

- *maculipes* (Giebel), 1874.  
Hab.: *Mycteria americana* (L.)
- *obscurus* (Giebel), 1874.  
Hab.: *Casmerodius albus egretta* (Gmelin)

GENERO *Colpocephalum* Nitzsch, 1818

- *ajajae* Ewing, 1930.  
Hab.: *Ajaja ajaja* (L.)
- *albonigrum* Giebel, 1874.  
Hab.: *Ostinops decumanus maculosus* (Chapman)
- *angulaticeps* Piaget, 1880.  
Hab.: *Fregata magnificens* (L.)
- *breve* Giebel, 1866.  
Hab.: *Cariama cristata* (L.)
- *cinctum* Rudow, 1866.  
Hab.: *Priocella antarctica* (Stephens)
- *costaricense* Carriker, 1903.  
Hab.: *Buteo swainsoni* Bonaparte
- *kelloggi* Osborn, 1902.  
Hab.: *Cathartes aura ruficollis* (Spix)
- *leptopygos* Nitzsch  
Hab.: *Plegadis falcinellus guarauna* (L.)
- *megalops* Giebel, 1874.  
Hab.: *Sarcorhamphus papa* (L.)
- *notatum* Piaget, 1885.  
Hab.: *Cariama cristata* (L.)
- *osborni* Kellogg, 1896.  
Hab.: *Elanus leucurus leucurus* (Vieillot)
- *polybori* Rudow, 1869.  
Hab.: *Polyborus plancus plancus* (J. F. Miller)
- *scalariforme* Rudow, 1866.  
Hab.: *Mycteria americana* (L.)
- *trichosum* Harrison, 1916.  
Hab.: *Vultur gryphus* (L.)
- *trispinum* Piaget, 1885.  
Hab.: *Theristicus caudatus* (Boddaert)
- *turbinatum* Denny, 1842. L. var. *domestica*.  
Hab.: *Columbia livia* L. var. *domestica*.
- *wernecki* Orfila, 1953.  
Hab.: *Chunga burmeisteri* (Hartlaub)

GENERO *Cuculiphilus* Uchida, 1926

- *cathartaepapae* Nitzsch, 1861.  
Hab.: *Sarcorhamphus papa* (L.)

- *coragypsis* Eichler, 1948.  
Hab.: *Coragyps atratus foetens* (Lichtenstein)
- *decoratus* Kellogg, 1896.  
Hab.: *Coccyzus americanus julieni* Lawrence
- *snodgrassi* Kellogg & Kuwana, 1902.  
Hab.: *Coccyzus melanocoryphus* Vieillot
- *zonatus* (Piaget), 1885.  
Hab.: *Vultur gryphus* (L.)

GENERO *Dicteisia* Bedford, 1939

- *tristis* (Giebel), 1874.  
Hab.: *Chauna torquata* (Oken)

GENERO *Eidmanniella* Kéler, 1938

- *aurifasciata* (Kellogg), 1899.  
Hab.: *Fregata magnificens* (L.)
- *eurygaster* (Nitzsch), 1866.  
Hab.: *Phalacrocorax olivaceus olivaceus* (Humboldt)

GENERO *Hohorstiella* Eichler, 1940

- *andina* Carriker, 1949.  
Hab.: *Metriopelia aymara* (Prevost)
- *frontalis* Carriker, 1949.  
Hab.: *Columba fasciata albilinea* Bonaparte
- *lata* Piaget, 1880.  
Hab.: *Columba livia* L. var. *domestica*

GENERO *Holomenopon* Eichler, 1941

- *brevithoracicum* (Piaget), 1880.  
Hab.: *Cygnus melancoriphus* (Molina)
- *cairinae* Eichler, 1943.  
Hab.: *Cairina moschata* (L.)

GENERO *Kurodaia* Uchida, 1926

- *crassiceps* (Piaget), 1885.  
Hab.: *Pulsatrix perspicillata* (Latham)
- koepckeii* Eichler, 1953.  
Hab.: *Chondrohierax uncinatus uncinatus* (Temminck)
- pectinata* (Osborn), 1902.  
Hab.: *Speotyto cunicularia cunicularia* (Molina)
- subpachygaster* (Piaget), 1880.  
Hab.: *Tyto alba tuidara* (Gray)

GENERO *Machaerilaemus* Harrison, 1915

- atrocephalus* Carriker, 1944.  
Hab.: *Asthenes modesta modesta* (Eyton)
- bolivianus* Carriker, 1944.  
Hab.: *Muscisaxicola capistrata* (Burmeister)
- juninensis* Carriker, 1944.  
Hab.: *Agriornis montana leucura* Gould
- laticorpus* (Carriker), 1903.  
Hab.: *Thamnophilus doliatus radiatus* Vieillot
- tachuris* Carriker, 1944.  
Hab.: *Tachuris rubrigaster rubrigaster* (Vieillot)

GENERO *Menocanthus* Neumann, 1912

- annulatus* (Giebel), 1874.  
Hab.: *Passer domesticus domesticus* (L.)
- artifasciatus* (Piaget), 1885.  
Hab.: *Rhynchotus rufescens rufescens* (Temminck)
- brasiliensis* Carriker, 1946.  
Hab.: *Odontophorus capueira capueira* (Spix)
- cornutus* (Schömmmer), 1913.  
Hab.: *Gallus domesticus* (L.)
- expansus* (Osborn), 1896.  
Hab.: *Dolychonyx oryzivorus* (L.)

*longispinus* Carriker, 1946.

Hab.: *Odontophorus capueira capueira* (Spix)

*notoproctae* Carriker, 1944.

Hab.: *Nothoprocta cinerascens* (Burmeister)

*pallidulus* Neumann, 1912.

Hab.: *Gallus domesticus* (L.)

*spiniferus* Piaget, 1885.

Hab.: *Cyanocorax chrysops* (Vieillot)

*stramineus* (Nitzsch), 1918.

Hab.: *Meleagris gallopavo* (L.) variedad doméstica

*translucidus* (Piaget), 1885.

Hab.: *Amblyrhamphus holosericeus* (Scopoli)

GENERO *Menopon* Nitzsch, 1818

*gallinae* (L.), 1758.

Hab.: *Gallus gallus* (L.) variedad doméstica

GENERO *Microctenia* Kéler, 1939

*tibialis* Kéler, 1939.

Hab.: *Tinamus solitarius* (Vieillot)

GENERO *Myrsidea* Waterston, 1915

*abreviata* Eichler, 1951.

Hab.: *Ramphastos dicolorus* (L.)

*argentina* Kellogg, 1906.

Hab.: *Spinus magellanicus magellanicus* (Vieillot)

*bonariensis* Malcomson, 1929.

Hab.: *Molothrus bonariensis* (Gmelin)

*diffusa* (Kellogg), 1899.

Hab.: *Amblycercus holosericeus* (Lichtenstein)

*fallax* Kéler, 1938.

Hab.: *Cyanocorax cyanomelas* (Vieillot)

*magnidens* Stafford, 1943.

Hab.: *Pitangus sulphuratus bolivianus* (Lafresnaye)

*quadrifasciata* (Piaget), 1880.

Hab.: *Passer domesticus* (L.)

*serini* (Séguy), 1944.

Hab.: *Serinus canarius serinus* (L.)

GENERO *Osborniella* Thompson, 1948

*crotophagae* (Stafford), 1943.

Hab.: *Crotophaga ani* (L.)

*guiraensis* (Kellogg), 1906.

Hab.: *Guira guira* (Gmelin)

*pectiniifera* (Piaget), 1885.

Hab.: *Milvago chimango* (Vieillot)

GENERO *Piagetiella* Neumann, 1906

*vigua* (Eichler), 1943.

Hab.: *Phalacrocorax olivaceus olivaceus* (Humboldt)

GENERO *Plegadiphilus* Bedford, 1939

*mamillatus* (Piaget), 1885.

Hab.: *Theristicus caudatus* (Boddaert)

*plegadis* Dubinin.

Hab.: *Plegadis falcinellus guarauna* (L.)

GENERO *Procellariphaga* Eichler, 1949

*affinis* (Piaget), 1890.

Hab.: *Diomedea exulans* (L.)

*daptionis* Eichler, 1949.

Hab.: *Daption capensis* (L.)

*longithoracica* (Piaget), 1880.

Hab.: *Adamastor cinereus* (Gmelin)

*ossifragae* Eichler, 1949.

Hab.: *Macronectes giganteus* (Gmelin)

*paulula* (Kellogg & Chapman), 1899.

Hab.: *Puffinus griseus* (Gmelin)

GENERO *Pseudomenopon* Mjöberg, 1910*stresemanni* Eichler, 1949.Hab.: *Aramus scolopaceus carau* (Vieillot)GENERO *Psittacomenopon* Bedford, 1930*burmeisteri* (Kellogg), 1906.Hab.: *Ara chloroptera* (G. R. Gray)*pachypus* (Piaget), 1880.Hab.: *Momotus momota pilcomayensis* (Reichenow)GENERO *Rediella* Hopkins, 1948*pediculoides* (Mjöberg), 1910.Hab.: *Arenaria interpres morinella* (L.)GENERO *Trinoton* Nitzsch, 1818*aculeatum* Piaget, 1885.Hab.: *Dendrocygna viduata* (L.)*anserinum* (J. C. Fabricius), 1805.Hab.: *Anser anser* (L.) variedad domestica*squalidum* Denny, 1842.Hab.: *Anser anser* (L.) variedad domestica

## FAMILIA LAEMOBOTHRIDAE Mjöberg, 1910

GENERO *Laemobothrion* Nitzsch, 1818*buteonivorum* (Packard), 1872.Hab.: *Buteo swainsoni* Bonaparte*canalense* Eichler, 1942.Hab.: *Sarcohamphus papa* (L.)*caracaraensis* Kellogg, 1906.Hab.: *Polyborus plancus plancus* (Miller)*chloropodis* (Schränk), 1803.Hab.: *Gallinula chloropus galeata* (Lichtenstein)*chondrohieracis* Eichler, 1953.Hab.: *Chondrohierax uncinatus uncinatus* (Temminck)*glutinans* Nitzsch, 1861.Hab.: *Sarcorhamphus papa* (L.)*plegadilymanticum* (Eichler), 1943.Hab.: *Ardea cocoi* (L.)*setigerum* Piaget, 1889.Hab.: *Mesembrinibis cayennensis* (Gmelin)

## FAMILIA RICINIDAE Neumann

GENERO *Ricinus* De Geer, 1778*leptosomun* (Carriker), 1903.Hab.: *Myiozetetes similis similis* (Spix)*pallens* Kellogg, 1899.Hab.: *Elainea flavogaster flavogaster* (Thunberg)

## FAMILIA BOOPIDAE Mjöberg, 1910

GENERO *Heterodoxus* Le Souëf & Bullen, 1902*spiniger* (Enderlein), 1909.Hab.: *Canis familiaris* L., *Oncifelis salinarum* Thomas

## FAMILIA TRIMENOPONIDAE Harrison, 1915

GENERO *Trimenopon* Cummings, 1913*hispidum* (Burmeister), 1838.Hab.: *Cavia porcellus* (L.), *Cavia aperea azarae* (Lichtenstein)

GENERO *Philandesia* Kellogg & Nakayama, 1914*chinchillae* (Werneck), 1935.Hab.: *Chinchilla laniger* (Molina)*mazzai* Werneck, 1933.Hab.: *Chinchilla laniger* (Molina)*townsendi* Kellogg & Nakayama, 1914.Hab.: *Chinchilla laniger* (Molina)FAMILIA *GYROPIDAE* Kellogg, 1896GENERO *Gliricola* Mjöberg, 1910*brasiliensis* Werneck, 1934.Hab.: *Cavia aperea* (Lichtenstein)*porcelli* (Schrank), 1781.Hab.: *Cavia porcellus* (L.), *Cavia tschudii sodalis* Thomas; *Cavia aperea azarae* (Lichtenstein)*cuadrisetosus* (Ewing), 1924.Hab.: *Galea musteloides leucoblephara* (Burmeister)GENERO *Gyropus* Nitzsch, 1818*ovalis* Burmeister, 1838.Hab.: *Cavia cobaya* Pallas; *Cavia aperea azarae* (Lichtenstein); *Cavia tschudii sodalis* Thomas, y *Cavia pamparum* Thomas.*parvus* (Ewing), 1936.Hab.: *Ctenomys colburni* Allen; *Ctenomys sericeus* Allen; *Ctenomys magellanicus* Bennett.GENERO *Macrogyropus* Ewing, 1924*amplexans amplexans* (Neumann), 1912.Hab.: *Dasyprocta variegata boliviae* Thomas*costalimai* (Werneck), 1931.Hab.: *Cuniculus paca* (L.)*dicotylis* (Macalister), 1869.Hab.: *Tayassu tajacu tajacu* (L.)*heteronychus* (Ewing), 1924.Hab.: *Galea musteloides musteloides* (Meyen); *Galea musteloides leucoblephara* (Burmeister).GENERO *Phtheiropoios* Eichler, 1940*forficulatus* (Neumann), 1912.Hab.: *Ctenomys sylvanus utilis* Thomas*latipollicaris* (Ewing), 1924.Hab.: *Ctenomys osgoodi* Allen; *Ctenomys colburni* Allen; *Reithrodon cuniculoides hatcheri* Allen*nematophallus* (Werneck), 1935.Hab.: *Ctenomys opimus luteolus* Thomas*pollicaris* (Ewing), 1924.Hab.: *Ctenomys osgoodi* Allen, *Ctenomys magellanicus* Bennett*wetmorei* Ewing, 1924.Hab.: *Ctenomys latro* Thomas; *Ctenomys budini barbarus* Thomas, y *Ctenomys sylvanus utilis* ThomasGENERO *Pitrufulquia* Marelli, 1932*coypus* Marelli, 1932.Hab.: *Myocastor coypus* (Molina)GENERO *Protogyropus* Ewing, 1924*normalis* Ewing, 1924.Hab.: *Caviella australis australis* (Geoffroy & D'Orbigny), y *Caviella australis salinia* (Thomas)

## FAMILIA TRICHODECTIDAE Kellog, 1896

GENERO *Cebidicola* Bedford, 1936

- semiarmatus* (Neumann), 1913.  
Hab.: *Alouatta caraya* Humboldt

GENERO *Damalinia* Mjöberg, 1910

- bovis* (L.), 1758.  
Hab.: *Bos taurus* (L.)  
*breviceps* (Rudow), 1866.  
Hab.: *Lama huanaca glama* (L.)  
*caprae* (Gurlt), 1843.  
Hab.: *Capra hircus* (L.)  
*equi* (Denny), 1842.  
Hab.: *Equus caballus* (L.)  
*ovis* (Schränk), 1781.  
Hab.: *Ovis aries* (L.)

GENERO *Eutrichophilus* Mjöberg, 1910

- cordiceps* Mjöberg 1910.  
Hab.: *Coendu (Sphingurus) paraguayensis* Oken  
*minor* Mjöberg, 1910.  
Hab.: *Coendu (Sphingurus) paraguayensis* Oken

GENERO *Felicola* Ewing, 1929

- felis* Werneck, 1934.  
Hab.: *Felis chibigouazou* Griffith; *Felis geoffroyi* D'Orbigny; *Felis jaguarundi* Fischer; *Felis pajeros* Azara  
*subrostratus* (Burmeister), 1838.  
Hab.: *Felis catus* (L.)

GENERO *Neotrichodectes* Ewing, 1929

- chilensis* Werneck, 1948.  
Hab.: *Conepatus humboldti* Gray  
*pallidus* (Piaget), 1880.  
Hab.: *Nasua narica* (L.)

GENERO *Suricatoecus* Bedford, 1932

- Jahrenholzi* Werneck, 1948.  
Hab.: *Dusicyon thous azarae* (Wied)

GÉNERO *Trichodectes* Nitzsch, 1896

- barbarae* Neumann, 1913.  
Hab.: *Galera barbara* (L.)  
*canis* (De Geer), 1778.  
Hab.: *Canis familiaris* L.  
*fallax* Werneck, 1948.  
Hab.: *Procyon cancrivorus* Cuvier  
*galictidis* Werneck, 1934.  
Hab.: *Grisonella furax* (Thomas)

GENERO *Tricholipeurus* Bedford, 1929

- dorcelaphi* Werneck, 1936.  
Hab.: *Blastocercus bezoarticus* (L.)

## FAMILIA PHILOPTERIDAE Burmeister, 1838

GENERO *Acidoproctus* Piaget, 1878

- fuligulae* Eichler, 1948.  
Hab.: *Metopiana peposaca* (Vieillot)  
*hopkinsi* Carriker, 1949.  
Hab.: *Dendrocrygna autumnalis discolor* Sclater & Salvin

GENERO *Philandesia* Kellogg & Nakayama, 1914*chinchillae* (Werneck), 1935.Hab.: *Chinchilla laniger* (Molina)*mazzai* Werneck, 1933.Hab.: *Chinchilla laniger* (Molina)*townsendi* Kellogg & Nakayama, 1914.Hab.: *Chinchilla laniger* (Molina)FAMILIA *GYROPIDAE* Kellogg, 1896GENERO *Gliricola* Mjöberg, 1910*brasiliensis* Werneck, 1934.Hab.: *Cavia aperea* (Lichtenstein)*porcelli* (Schrank), 1781.Hab.: *Cavia porcellus* (L.), *Cavia tschudii sodalis* Thomas; *Cavia aperea azarae* (Lichtenstein)*cuadrisetosus* (Ewing), 1924.Hab.: *Galea musteloides leucoblephara* (Burmeister)GENERO *Gyropus* Nitzsch, 1818*ovalis* Burmeister, 1838.Hab.: *Cavia cobaya* Pallas; *Cavia aperea azarae* (Lichtenstein); *Cavia tschudii sodalis* Thomas, y *Cavia pamparum* Thomas.*parvus* (Ewing), 1936.Hab.: *Ctenomys colburni* Allen; *Ctenomys sericeus* Allen; *Ctenomys magellanicus* Bennett.GENERO *Macrogyropus* Ewing, 1924*amplexans amplexans* (Neumann), 1912.Hab.: *Dasyprocta variegata boliviae* Thomas*costalimai* (Werneck), 1931.Hab.: *Cuniculis paca* (L.)*dicotylis* (Macalister), 1869.Hab.: *Tayassu tajacu tajacu* (L.)*heteronychus* (Ewing), 1924.Hab.: *Galea musteloides musteloides* (Meyen); *Galea musteloides leucoblephara* (Burmeister).GENERO *Phtheiropoios* Eichler, 1940*forficulatus* (Neumann), 1912.Hab.: *Ctenomys sylvanus utibilis* Thomas*latipollicaris* (Ewing), 1924.Hab.: *Ctenomys osgoodi* Allen; *Ctenomys colburni* Allen; *Reithrodon cuniculoides hatcheri* Allen*nematophallus* (Werneck), 1935.Hab.: *Ctenomys opimus luteolus* Thomas*pollicaris* (Ewing), 1924.Hab.: *Ctenomys osgoodi* Allen, *Ctenomys magellanicus* Bennett*wetmorei* Ewing, 1924.Hab.: *Ctenomys latro* Thomas; *Ctenomys budini barbarus* Thomas, y *Ctenomys sylvanus utibilis* ThomasGENERO *Pitruquenia* Marelli, 1932*coypus* Marelli, 1932.Hab.: *Myocastor coypus* (Molina)GENERO *Protogyropus* Ewing, 1924*normalis* Ewing, 1924.Hab.: *Caviella australis australis* (Geoffroy & D'Orbigny), y *Caviella australis salina* (Thomas)



## FAMILIA TRICHODECTIDAE Kellog, 1896

GENERO *Cebidicola* Bedford, 1936

- semiarmatus* (Neumann), 1913.  
Hab.: *Alouatta caraya* Humboldt

GENERO *Damalinia* Mjöberg, 1910

- bovis* (L.), 1758.  
Hab.: *Bos taurus* (L.)  
*breviceps* (Rudow), 1866.  
Hab.: *Lama huanaca glama* (L.)  
*caprae* (Gurlt), 1843.  
Hab.: *Capra hircus* (L.)  
*equi* (Denny), 1842.  
Hab.: *Equus caballus* (L.)  
*ovis* (Schränk), 1781.  
Hab.: *Ovis aries* (L.)

GENERO *Eutrichophilus* Mjöberg, 1910

- cordiceps* Mjöberg 1910.  
Hab.: *Coendu (Sphingurus) paraguayensis* Oken  
*minor* Mjöberg, 1910.  
Hab.: *Coendu (Sphingurus) paraguayensis* Oken

GENERO *Felicola* Ewing, 1929

- felis* Werneck, 1934.  
Hab.: *Felis chibigouazou* Griffith; *Felis geoffroyi* D'Orbigny; *Felis jaguarundi* Fischer; *Felis pajeros* Azara  
*subrostratus* (Burmeister), 1838.  
Hab.: *Felis catus* (L.)

GENERO *Neotrichodectes* Ewing, 1929

- chilensis* Werneck, 1948.  
Hab.: *Conepatus humboldti* Gray  
*pallidus* (Piaget), 1880.  
Hab.: *Nasua narica* (L.)

GENERO *Suricatoecus* Bedford, 1932

- fahrenheitzi* Werneck, 1948.  
Hab.: *Dusicyon thous azarae* (Wied)

GÉNERO *Trichodectes* Nitzsch, 1896

- barbarae* Neumann, 1913.  
Hab.: *Galera barbara* (L.)  
*canis* (De Geer), 1778.  
Hab.: *Canis familiaris* L.  
*fallax* Werneck, 1948.  
Hab.: *Procyon cancrivorus* Cuvier  
*galictidis* Werneck, 1934.  
Hab.: *Grissonella furax* (Thomas)

GENERO *Tricholipeurus* Bedford, 1929

- dorcelaphi* Werneck, 1936.  
Hab.: *Blastocerus bezoarticus* (L.)

## FAMILIA PHILOPTERIDAE Burmeister, 1838

GENERO *Acidoproctus* Piaget, 1878

- fuligatae* Eichler, 1948.  
Hab.: *Metopiana peposaca* (Vieillot)  
*hopkinsi* Carriker, 1949.  
Hab.: *Dendrocygna autumnalis discolor* Sclater & Salvin

*rostratus* (Rudow), 1866.

Hab.: *Dendrocygna viduata* (L.)

GENERO *Acutifrons* Guimarães, 1942

*chimango* Eichler, 1948.

Hab.: *Mitvago chimango* (Vieillot)

*vierai* Guimarães, 1942.

Hab.: *Hypomorphus urubitinga azarae* (Swann)

GENERO *Anaticola* Clay, 1936

*anseris* (L.), 1758.

Hab.: *Anser anser* (L.)

*breviceps* (Piaget), 1888.

Hab.: *Tachyeres brachyptera* (Latham)

*cairincsis* (Castro), 1933.

Hab.: *Cairina moschata* (L.)

*crassicornis* Scopoli, 1763.

Hab.: *Anas platyrhynchos platyrhynchos* (L.)

*marginellus* (Piaget), 1885.

Hab.: *Chloephaga leucoptera* (Gmelin)

GENERO *Anatoecus* Cummings, 1916

*adustus* (Nitzsch), 1874.

Hab.: *Anser anser* (L.) variedad doméstica

*dentatus* (Scopoli), 1763.

Hab.: *Anas platyrhynchos platyrhynchos* (L.)

*monteiri* Pessôa & Guimarães, 1935.

Hab.: *Anas brasiliensis* Gmelin

GENERO *Ardeicola* Clay, 1936

*albus* Eichler, 1948.

Hab.: *Casmerodius albus egretta* (Gmelin)

*loculator* (Giebel), 1874.

Hab.: *Mycteria americana* (L.)

*ovosignatus* Eichler, 1953.

Hab.: *Plegadis ridgwayi* (Allen)

*theristicus* (Pessôa & Guimarães), 1935.

Hab.: *Theristicus caudatus* (Boddaert)

*rhapsidius* (Nitzsch), 1866.

Hab.: *Plegadis falcinellus guarauna* (L.)

GENERO *Ardeiphagus* Carriker, 1949

*cochlearius* Carriker, 1949.

Hab.: *Cochlearius cochlearius cochlearius* (L.)

GENERO *Austrogoniodes* Harrison, 1915

*antarticus* Harrison, 1937.

Hab.: *Pygoscelis adeliae* (Hombron & Jacquinot)

*bifasciatus* (Piaget), 1885.

Hab.: *Spheniscus magellanicus* (Forster)

*brevipes* (Giebel), 1876.

Hab.: *Aptenodytes patagonica patagonica* Miller.

*concii* Kéler, 1952.

Hab.: *Eudyptes cristatus cristatus* (Miller)

*cristati* Kéler, 1952.

Hab.: *Eudyptes cristatus cristatus* (Miller)

*fawsoni* Harrison, 1937.

Hab.: *Aptenodytes forsteri* G. R. Gray

GENERO *Bedfordiella* Thompson, 1937

*unica* Thompson, 1937.

Hab.: *Pterodroma brevirostris* (Lesson)

GENERO *Bizarriifrons* Eichler, 1938

*magnus* (Nitzsch), 1866.

Hab.: *Ostinops decumanus decumanus* (Pallas)

GENERO *Brüelia* Kéler, 1936

- crassipedalis* (Harrison), 1916.  
 Hab.: *Thinocorus rumicivorus* Eschscholtz  
*marginella* (Nitzsch), 1866.  
 Hab.: *Momotus momota pilcomajensis* Reichenow  
*nitzschi* Kéler, 1938.  
 Hab.: *Cyanocorax cyanomelas* (Vieillot)  
*oxygyga* (Giebel), 1874.  
 Hab.: *Amblyrhampus holosericeus* (Scopoli)  
*parabolocybe* (Carriker), 1903.  
 Hab.: *Tyrannus melancholicus melancholicus* (Vieillot)  
*tenuis* (Burmeister), 1838.  
 Hab.: *Riparia riparia riparia* (L.)  
*trithorax* (Burmeister), 1838.  
 Hab.: *Paroaria coronata* (Miller)

GENERO *Carduiceps* Clay & Meinertzhagen, 1939

- compleximus* (Kellogg & Chapman), 1899.  
 Hab.: *Crocethia alba* (Pallas)  
*fulvofasciatus* (Grube), 1851.  
 Hab.: *Erolia testacea* (Pallas)  
*subscalaris* (Piaget), 1880.  
 Hab.: *Phalaropus lobatus* (L.)

GENERO *Chelopistes* Kéler, 1939

- guttatus* (Carriker), 1945.  
 Hab.: *Odontophorus capueira capueira* (Spix)  
*meleagridis* (L.), 1758.  
 Hab.: *Meleagris gallopavo* (L.) variedad doméstica  
*quadracapitis* (Carriker), 1945.  
 Hab.: *Penelope obscura bridgesi* G. R. Gray

GENERO *Columbicola* Ewing, 1929

- columbae* (L.), 1758.  
 Hab.: *Columba livia* L., variedad doméstica  
*pseudolipeurusque* Eichler, 1952.  
 Hab.: *Columbina picui picui* (Temminck)  
*triangularis* Eichler, 1952.  
 Hab.: *Columba picazuro picazuro* Temminck

GENERO *Cuculicota* Clay & Meinertzhagen, 1939

- atopus* (Kellogg), 1899.  
 Hab.: *Piaya cayana macroura* Gambel  
*sculptus* (Kolenati), 1858.  
 Hab.: *Tapera naevia chochi* (Vieillot)

GENERO *Degeeriella* Neumann, 1906

- aguiae* (Gervais), 1844.  
 Hab.: *Geranoaetus melanoleucus melanoleucus* (Vieillot)  
*carrikeri* Orfila, 1953.  
 Hab.: *Falco peregrinus anatum* Bonaparte

GENERO *Docophoroides* Giglioli, 1864

- brevis* (Dufour), 1835.  
 Hab.: *Diomedea exulans* L.  
*harrisoni* Waterston, 1917.  
 Hab.: *Diomedea melanophris* Temminck  
*hunteri* Harrison, 1937.  
 Hab.: *Macronectes giganteus* (Gmelin)  
*murphyi* (Kellogg), 1914.  
 Hab.: *Diomedea melanophris* Temminck; *Macronectes giganteus* (Gmelin)  
*simples* (Waterston), 1914.  
 Hab.: *Diomedea melanophris* Temminck

GENERO *Episbates* Harrison, 1935

- pederiformis* (Dufour), 1835.  
Hab.: *Diomedea exulans* L.

GENERO *Esthiopterum* Harrison, 1916

- tataupa* Carriker, 1936.  
Hab.: *Crypturellus tataupa tataupa* (Temminck)

GENERO *Falcolipeurus* Bedford, 1931

- assessor* (Giebel), 1874.  
Hab.: *Vultur gryphus* L.  
*marginalis* (Osborn), 1902.  
Hab.: *Cathartes aura ruficollis* Spix  
*quadriguttatus* (Giebel), 1874.  
Hab.: *Rosthramus sociabilis sociabilis* (Vieillot)  
*ternatus* (Burmeister), 1838.  
Hab.: *Sarcorhamphus papa* (L.)

GENERO *Fulicoffula* Clay & Meinertzhagen, 1938

- comstocki* (Kellogg & Chapman), 1902.  
Hab.: *Rallus limicola antarcticus* King  
*volsella* (Ewing), 1930.  
Hab.: *Aramides cajanea cajanea* (P. L. S. Müller)

GENERO *Goniocotes* Burmeister, 1838

- gallinae* (De Geer), 1778.  
Hab.: *Gallus gallus* L. variedad domesticus

GENERO *Goniodes* Nitzsch, 1818

- dissimilis* Denny, 1842.  
Hab.: *Gallus gallus* L. variedad domesticus  
*gigas* (Taschenberg), 1879.  
Hab.: *Gallus gallus* L. variedad domesticus  
*numidae* Mjöberg, 1910.  
Hab.: *Numida meleagris meleagris* (L.)

GENERO *Halipeurus* Thompson, 1936

- abnormis* (Piaget), 1885.  
Hab.: *Puffinus gravis* (O'Reilly)  
*angusticeps* (Piaget), 1880.  
Hab.: *Adamastor cinereus* (Gmelin)  
*diversus* (Kellogg), 1896.  
Hab.: *Pterodroma macroptera macroptera* (A. Smith)  
*nigricans* (Rudow), 1869.  
Hab.: *Pterodroma mollis mollis* (Gould)  
*procellariae* (J. C. Fabricius), 1775.  
Hab.: *Pterodroma macroptera macroptera* (A. Smith)

GENERO *Harrisoniella* Bedford, 1929

- perox* (Giebel), 1867.  
Hab.: *Diomedea melanophris* Temminck  
*hopkinsi* Eichler, 1952.  
Hab.: *Diomedea exulans exulans* L.  
*thompsoni* Eichler, 1952.  
Hab.: *Diomedea epomophora longirostris* Mathews

GENERO *Ibidoecus* Cummings, 1916

- bisignatus* (Nitzsch), 1866.  
Hab.: *Plegadis falcinellus guarauna* (L.)  
*carau* Carriker, 1947.  
Hab.: *Aramus scolopaceus carau* Vieillot  
*heterogenitalis* Carriker, 1947.  
Hab.: *Theristicus caudatus* (Boddaert)  
*iberoamericanus* Eichler, 1943.  
Hab.: *Ajaia ajaja* (L.)

*phimosus* Carriker, 1947.

Hab.: *Phimosus infuscatus infuscatus* (Lichtenstein)

*plegadii* Carriker, 1947.

Hab.: *Plegadis ridgwayi* (Allen)

*scolopaceus* Carriker, 1947.

Hab.: *Aramus scolopaceus carau* (Vieillot)

GENERO *Incidifrons* Ewing, 1929

*monachus* (Kellogg & Paine), 1911.

Hab.: *Rallus limicola antarcticus* King

GENERO *Lipeurus* Nitzsch, 1818

*caponis* (L.), 1758.

Hab.: *Gallus gallus* L. variedad *domesticus*

GENERO *Luniceps* Clay & Meinertzhagen, 1939

*actophilus* (Kellogg & Chapman), 1899.

Hab.: *Crocethia alba* (Pallas)

*incoenis* (Kellogg & Chapman), 1899.

Hab.: *Squatarola squatarola squatarola* (L.)

*parabolicus* Eichler, 1953.

Hab.: *Ptiloscelys resplendens* (Tschudi)

GENERO *Meinertzhageniella* Eichler, 1940

*latus* Piaget, 1880 .

Hab.: *Rhea americana albescens* Lynch & Holmberg

*schubarti* Eichler, 1941.

Hab.: *Pterocnemia pennata pennata* (D'Orbigny)

GENERO *Multicola* Clay & Meinertzhagen, 1938

*tenuiceps* Carriker, 1945.

Hab.: *Podager nacunda nacunda* (Vieillot)

*macrocephalus* (Kellogg), 1896.

Hab.: *Chordeiles minor chapmani* (Coues)

GENERO *Naubates* Bedford, 1930

*clypeatus* (Giebel), 1874.

Hab.: *Halobaena caerulea* (Gmelin)

*fuliginosis* (Taschenberg), 1882.

Hab.: *Diomedea exulans* L.

*harrisoni* Bedford, 1930.

Hab.: *Ardenna kuhli gravis* (O'Reilly)

*heteroproctus* Harrison, 1937.

Hab.: *Pterodroma lessoni lessoni* (Garnot)

*prioni* (Enderlein), 1908.

Hab.: *Pachyptila desolata georgia* (Mathews)

*pterodromi* Bedford, 1930.

Hab.: *Pterodroma macroptera macroptera* (Smith)

*testaceus* (Taschenberg), 1882.

Hab.: *Daption capensis* (L.)

GENERO *Neophilopterus* Cummings, 1916

*heteropygus* (Nitzsch), 1874.

Hab.: *Mycteria americana* (L.)

*orfilai* Guimarães, 1943.

Hab.: *Ajaia ajaja* (L.)

*subincompletus* (Nitzsch), 1866.

Hab.: *Ciconia galatea* Molina

GENERO *Oxylipeurus* Mjöberg, 1910

*bridgesi* Carriker, 1944.

Hab.: *Penelope obscura bridgesi* G. R. Gray

*polytrapezius* (Burmeister), 1838.

Hab.: *Meleagris gallopavo* L.

*sinuosus* Carriker, 1945.

Hab.: *Odontophorus capueira capueira* (Spix)

GENERO *Paragoniocotes* Cummings, 1916

*abnormis* (Kellogg), 1906.

Hab.: *Ara chloroptera* Gray

*bolivianus* Carriker, 1950.

Hab.: *Amazona aestiva xanthopteryx* (Berlepsch)

*costalimai* Guimarães, 1947.

Hab.: *Pionus maximiliani* Sjö

*fulvofasciatus* (Picaglia), 1885.

Hab.: *Myiopsitta monacha monacha* (Boddaert)

*heterogenitalis* Carriker, 1947.

Hab.: *Amazona aestiva xanthopteryx* (Berlepsch)

*limai* Guimarães, 1947.

Hab.: *Pionopsitta pileata* (Scopoli)

*militaris* Carriker, 1950.

Hab.: *Ara militaris boliviana* (L.)

*neivai* Guimarães, 1940.

Hab.: *Forpus passerinus vividus* (Ridgway)

*nirmoides* Guimarães, 1947.

Hab.: *Brotogeris versicolurus chiriri* (Vieillot)

*pyrrhurae* Guimarães, 1947.

Hab.: *Pyrrhura frontalis chiripepe* (Vieillot)

*tenuigaster* Carriker, 1947.

Hab.: *Amazona tucumana* (Cabanis)

*tucumanae* Carriker, 1950.

Hab.: *Amazona tucumana* (Cabanis)

GENERO *Passonomedea* Carriker, 1944

*hopkinsi* Carriker, 1944.

Hab.: *Odontophorus capueira capueira* (Spix)

GENERO *Pectinopygus* Mjöberg, 1910

*anhingae* (Peters), 1935.

Hab.: *Anhinga anhinga* (L.)

*gyroceras* (Nitzsch), 1866.

Hab.: *Phalacrocorax olivaceus olivaceus* (Humboldt)

GENERO *Pelmatocerandra* Enderlein, 1908

*enderleini* Eichler, 1949.

Hab.: *Pelecanoides georgica* (Murphy & Harper)

GENERO *Perineus* Harrison, 1936

*diomedae* (I. C. Fabricius), 1775.

Hab.: *Diomedea melanophris melanophris* Temminck, *Phoebetria palpebrata murphy* Mathews & Iredale.

*enderleini* Eichler, 1949.

Hab.: *Diomedea exulans* L.

*hyalinus* (Neumann), 1911.

Hab.: *Diomedea exulans* L.

*macropleurialis* Eichler, 1949.

Hab.: *Diomedea exulans* L.

*micronadalis* Eichler, 1949.

Hab.: *Diomedea exulans* L.

*obscurus* (Rudow), 1869.

Hab.: *Macronectes giganteus* (Gmelin)

GENERO *Philoceanus* Kellogg, 1903

*garrodiae* (Clay), 1940.

Hab.: *Garrodia nereis* (Gould)

*robertsi* (Clay), 1940.

Hab.: *Oceanites oceanicus oceanicus* (Kuhl)

GENERO *Philopterus* Nitzsch, 1818

*cardinalis* (Piaget), 1880.

Hab.: *Paroaria coronata* (Miller)

*insulicola* (Kellogg & Kuwana), 1902.

Hab.: *Pyrocephalus rubinus rubinus* (Boddaert)

*schulzkampfhenkeli* (Eichler), 1940.

Hab.: *Momotus momotus pilcomajensis* Reichenow

GENERO *Physconelloides* Ewing, 1927

*ceratoceps* Ewing, 1927.

Hab.: *Leptoptila verreauxi chalcauchenia* (Sclater & Salvin)

*recurvatus* Eichler, 1949.

Hab.: *Columbina picui picui* (Temminck)

GENERO *Pseudolipecurus* Carriker, 1936

*genitalis* Carriker, 1936.

Hab.: *Crypturellus undulatus undulatus* (Temminck)

*longipes* (Piaget), 1880.

Hab.: *Crypturellus obsoletus obsoletus* (Temminck)

*plumbeus* (Pessõa & Guimarães), 1935.

Hab.: *Crypturellus tataupa tataupa* (Temminck)

GENERO *Pseudonirmus* Mjöberg, 1910

*antarticus* Harrison, 1937.

Hab.: *Thalassoica antarctica* (Gmelin)

*caudatus* (Rudow), 1869.

Hab.: *Priocella antarctica* (Stephens)

*charcoti* (Neumann), 1907.

Hab.: *Pagodroma nivea* (Forster)

*gurlti* (Taschenberg), 1882.

Hab.: *Daption capensis* (L.)

GENERO *Quadroiceps* Clay & Meinertzhagen, 1939

*alpha* (Kellogg), 1914.

Hab.: *Catharacta skua antarctica* (Lesson)

*andinus* Carriker, 1944.

Hab.: *Recurvirostra andina* Philippi & Landbeck.

*austini* (Peters), 1931.

Hab.: *Tringa melanoleuca* (Gmelin)

*birostris* (Griebel), 1874.

Hab.: *Sterna fuscata fuscata* L.

*connexus* (Kellogg & Mann), 1912.

Hab.: *Lobipes lobatus* (L.)

*falcigerus* (Peters), 1931.

Hab.: *Tringa flavipes* (Gmelin)

*fimbriatus* (Giebel), 1866.

Hab.: *Steganopus tricolor* Vieillot.

*fuscolaminulatus* (Enderlein), 1908.

Hab.: *Larus dominicanus* Lichtenstein

*hemichrous* (Nitzsch), 1866.

Hab.: *Himantopus himantopus melanurus* Vieillot

*hospes* (Nitzsch), 1866.

Hab.: *Squatarola squatarola* (L.)

*hourii* Hopkins, 1949.

Hab.: *Sterna paradisaea* Pontoppidan

*meinertzhageni* Timmermann, 1952.

Hab.: *Attagis malouinus malouinus* (Boddaert)

*normifer* (Grube), 1851.

Hab.: *Stercorarius parasiticus* (L.)

*orarius* (Kellogg), 1896.

Hab.: *Pluvialis dominica dominica* (Müller)

*phalaropi* (Denny), 1842.

Hab.: *Phalaropus fulicarius* (L.)

*ravus* (Kellogg), 1899.

Hab.: *Actitis macularia* (L.)

*schuezi* (Eichler), 1941.

Hab.: *Larus maculipennis* Lichtenstein

*strepsilaris* (Denny), 1842.

Hab.: *Arenaria interpres interpres* (L.)

GENERO *Rallicola* Johnston & Harrison, 1911

*funnebris* (Nitzsch), 1866.

Hab.: *Aramus scolopaceus carau* Vieillot.

GENERO *Rhynonirmus* Thompson, 1935

- infuscatus* (Osborn), 1896.  
Hab.: *Bartramia longicauda* (Bechstein)

GENERO *Rotundiceps* Edwards, 1952

- cordatus* (Osborn), 1896.  
Hab.: *Limosa haemastica* L.

GENERO *Saemundssonina* Timmerman, 1935

- antarctica* (Wood), 1937.  
Hab.: *Pagodroma nivea* (Forster)  
*bicolor* (Rudow), 1870.  
Hab.: *Priocella antarctica* (Stephens)  
*cephalus* (Denni), 1842.  
Hab.: *Stercorarius parasiticus* (L.)  
*timmermanni* Orfila, 1953.  
Hab.: *Arenaria interpres interpres* (L.)  
*gaini* (Neumann), 1913.  
Hab.: *Macronectes giganteus* (Gmelin)  
*locklevi* Clay, 1949.  
Hab.: *Sterna vittata georgiae* Reichenow  
*naumanni* (Giebel), 1874.  
Hab.: *Squatarola squatarola* (L.)  
*niethammeri* Eichler, 1953.  
Hab.: *Phaethusa simplex chloropoda* (Vieillot)  
*optimalis* Eichler, 1953.  
Hab.: *Charadrius alticola* (Berlepsch & Stolzmann)  
*parva* (Piaget), 1880.  
Hab.: *Larus dominicanus* Lichtenstein  
*enderleini* (Eichler), 1949.  
Hab.: *Pterodroma mollis mollis* (Gould)  
*stresemanni* Timmermann, 1949.  
Hab.: *Catharacta skua chilensis* (Bonaparte)

GENERO *Strigiphilus* Mjöberg, 1910

- oculatus* (Rudow), 1870.  
Hab.: *Bubo virginianus nacurutu* (Vieillot)  
*rostratus* (Burmeister), 1838.  
Hab.: *Tyto alba tuidara* (Gray)  
*speotyti* (Osborn), 1896.  
Hab.: *Speotyto cunicularia cunicularia* (Molina)

GENERO *Struthiolipeurus* Cummings, 1916

- andinus* Carriker, 1945.  
Hab.: *Pteronamia pennata garleppi* Chubb.  
*rhaeae* (Harrison), 1916.  
Hab.: *Rhea americana albescens* Lynch & Holmberg.

GENERO *Tinamotaecola* Carriker, 1944

- andinae* Carriker, 1944.  
Hab.: *Tinamotis pentlandi* Vigors

GENERO *Trabeculus* Rudow, 1866

- heteracanthus* (Waterston), 1912.  
Hab.: *Macronectes giganteus* (Gmelin)  
*hexacon* (Waterston), 1914.  
Hab.: *Pterodroma macroptera macroptera* (Smith); *Attapriion desolatus banksi* (Smith); *Procellaria aequinotialis aequinotialis* L.; *Ardenna kuhli gravis* (O'Reilly)  
*mirabilis* (Kellogg), 1896.  
Hab.: *Paranectris griseus stricklandi* (Ridgway)  
*schillingi* Rudow, 1866.  
Hab.: *Pterodroma mollis mollis* (Gould)



GENERO *Trogoninirmus* Eichler, 1944

*odontopleuron* (Guimarães), 1944.  
Hab.: *Trogon surrucura* Vieillot

GENERO *Vernoniella* Guimarães, 1942

*bergi* (Kellogg), 1896.  
Hab.: *Guira guira* (Gmelin)  
*guimaraesi* Thompson, 1948.  
Hab.: *Crotophaga ani* L.  
*macgregori* (Kellogg), 1899.  
Hab.: *Crotophaga sulcirostris sulcirostris* Swainson

## FAMILIA HEPTAPSOGASTERIDAE Carriker, 1936

GENERO *Austrokelloggia* Carriker, 1936

*genitalis* (Carriker), 1936.  
Hab.: *Crypturellus tataupa tataupa* (Temminck)  
*mendax* (Guimarães & Hopkins), 1949.  
Hab.: *Crypturellus parvirostris* (Wagler)  
*obsoletus* (Carriker), 1936.  
Hab.: *Crypturellus obsoletus obsoletus* (Temminck)  
*undulatus* (Carriker), 1936.  
Hab.: *Crypturellus undulatus undulatus* (Temminck)

GENERO *Cuclofocephalus* Carriker, 1936

*similis* Carriker, 1944.  
Hab.: *Nothoprocta pentlandi pentlandi* (G. R. Gray)

GENERO *Discocorpus* Carriker, 1936

*microgenitalis* Carriker, 1936.  
Hab.: *Crypturellus tataupa tataupa* (Temminck)

GENERO *Heptapsogaster* Carriker, 1936

*andinae* (Carriker), 1944.  
Hab.: *Tinamotis pentlandi* Vigors.  
*carrikeri* (Clay), 1937.  
Hab.: *Nothoprocta cinerascens* (Burmeister)  
*chacoensis* (Carriker), 1944.  
Hab.: *Nothoprocta cinerascens* (Burmeister)  
*crenulatus* (Carriker), 1936.  
Hab.: *Rhynchotus rufescens maculicollis* G. R. Gray.  
*frielingi* (Eichler), 1941.  
Hab.: *Cariama cristata* (L.)  
*heterurus* (Carriker), 1944.  
Hab.: *Nothoprocta cinerascens* (Burmeister)  
*inexpectatus* (Eichler), 1942.  
Hab.: *Chunga burmeisteri* (Hartlaub)  
*insperatus* Hopkins, 1950.  
Hab.: *Crypturellus obsoletus obsoletus* (Temminck)  
*laticephalus* (Carriker), 1944.  
Hab.: *Crypturellus undulatus undulatus* (Temminck)  
*latithorax* (Carriker), 1936.  
Hab.: *Rhynchotus rufescens rufescens* (Temminck)  
*lunulatus* (Carriker), 1936.  
Hab.: *Rhynchotus rufescens maculicollis* G. R. Gray  
*mandibularis* Carriker, 1936.  
Hab.: *Crypturellus tataupa tataupa* (Temminck)  
*minor* Hopkins, 1950.  
Hab.: *Nothura maculosa nigroguttata* Salvadori  
*grandis* (Carriker), 1936.  
Hab.: *Tinamus solitarius* (Vieillot)  
*pentlandi* Carriker, 1944.  
Hab.: *Nothoprocta pentlandi pentlandi* (G. R. Gray)  
*rotundatus* (Rudow), 1869.  
Hab.: *Rhynchotus rufescens rufescens* (Temminck)  
*secundus* (Carriker), 1944.  
Hab.: *Rhynchotus rufescens maculicollis* G. R. Gray

*sexpunctatus* (Piaget), 1885.

Hab.: *Rhynchotus rufescens rufescens* (Temminck)

*sexsetosus* (Piaget), 1885.

Hab.: *Rhynchotus rufescens rufescens* (Temminck)

*stultus* Clay, 1947.

Hab.: *Crypturellus obsoletus obsoletus* (Temminck)

*subteres* (Carriker), 1944.

Hab.: *Nothoprocta pentlandi pentlandi* (G. R. Gray)

*temporalis* Carriker, 1936.

Hab.: *Crypturellus undulatus undulatus* (Temminck)

*undulatus* Carriker, 1944.

Hab.: *Crypturellus undulatus undulatus* (Temminck)

GENERO *Kelloggia* Carriker, 1903

*clayi* (Guimarães & Lane), 1937.

Hab.: *Tinamus solitarius* (Vieillot)

GENERO *Megapeostus* Carriker, 1936

*asymmetricus* Carriker, 1936.

Hab.: *Crypturellus undulatus undulatus* (Temminck)

*petersi* (Carriker), 1936.

Hab.: *Crypturellus tataupa tataupa* (Temminck)

GENERO *Ornicholax* Carriker, 1903

*alienus* (Giebel), 1874.

Hab.: *Tinamus solitarius* (Vieillot)

GENERO *Pectenosoma* Ewing, 1929

*parva* Carriker, 1936.

Hab.: *Crypturellus tataupa* (Temminck).

*subparva* Guimarães & Hopkins, 1949.

Hab.: *Crypturellus parvirostris* (Wagler).

GENERO *Pterocotes* Ewing, 1929

*solitarius* Guimarães & Lane, 1937.

Hab.: *Tinamus solitarius* (Vieillot)

GENERO *Rhopaloceras* Taschenberg, 1882

*oniscus* (Nitzsch), 1866.

Hab.: *Tinamus solitarius* (Vieillot)

*pennaticeps* (Paine & Mann), 1913.

Hab.: *Crypturellus parvirostris* (Wagler)

GENERO *Strongylocotes* Taschenberg, 1882

*alticola* Carriker, 1944.

Hab.: *Rhynchotus rufescens maculicollis* G. R. Gray

*complanatus* (Piaget), 1880.

Hab.: *Crypturellus obsoletus obsoletus* (Temminck)

*glabrus* (Carriker), 1936.

Hab.: *Crypturellus tataupa tataupa* (Temminck)

*lipogonus* (Nitzsch), 1866.

Hab.: *Rhynchotus rufescens rufescens* (Temminck)

*orbicularis* (Carriker), 1936.

Hab.: *Crypturellus parvirostris* (Wagler)

*wernecki* Guimarães & Lane, 1937.

Hab.: *Tinamus solitarius* (Vieillot)